

安康麦冬草 襄阳李莉麦冬草 细叶麦冬草

产品名称	安康麦冬草 襄阳李莉麦冬草 细叶麦冬草
公司名称	宜城市李莉麦冬草经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市王集镇
联系电话	15997257817

产品详情

麦冬除草过程中存在的问题：

- 1.传统的人工拔草，难以拔根，前除后长、效率低、成本高。
- 2.麦冬移栽生根难、缓苗期长(平均在2个月以上)、缓苗过程中杂草生长迅速，此时不能使用茎叶处理除草剂来防治麦冬草坪里的杂草，否则会严重影响麦冬草坪;
- 3.麦冬移栽成活后草坪里的杂草种类众多，使用一般的农用化学除草剂不能高效防除杂草，同时还会对麦冬草坪造成不同程度的伤害。

麦冬草喜温暖湿润，降雨充沛的气候条件5-30℃能正常生长，适生长气温15-25℃，中叶麦冬草，低于0℃或高于35℃生长停止，生长过程中需水量大，要求光照充足，麦冬草价格，尤其是块根膨大期，光照充足才能促进块根的膨大。

麦冬草是一种草本植物，麦冬草的花朵是紫色的，成群成片十分好看，麦冬草种苗主要分布在我国南方地区，日常也比较容易见到，分株繁殖是繁殖麦冬草主要的繁殖方式。

我们在采用分株繁殖的方式繁殖麦冬草时，首先要在四五月份之间的时候，挑选生长状况良好的麦冬草植株，健康的麦冬草植株一般叶片呈现出深绿色，同时要观察麦冬草植株是否有病虫害，有病虫害的麦冬草是不能用来进行分株繁殖的。

一般追肥3次以上，第一次在7月中旬。适合麦冬草生长的温度是15-25℃，对于低于0℃的麦冬草或者高于35℃的麦冬草将停止生长。第二次在8月上旬，第三次在11月初，追肥时氮肥不宜过多，以免引起地上部分徒长。浙江产区，除基肥外，栽植时在穴中施些过磷酸钙，混拌在土中，以提高产量。在麦冬地里间

作，不仅能增加收入，安康麦冬草，而且有利于麦冬生长，细叶麦冬草，进行间作可以减少烈日直射。麦冬植株矮小，如不经常除草，则杂草滋生，妨碍麦冬的生长。栽后半月就应除草一次，5~10月杂草容易滋生，每月需除草1~2次，入冬以后，杂草少，可减少除草次数，除草时结合进行中耕。