

近和板栗苗

产品名称	近和板栗苗
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	品牌:果之语农业 板栗苗:嫁接板栗苗 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

产品详情

近和板栗苗 嫁接板栗苗批发：华丰板栗苗、华光板栗苗、红栗1号板栗苗、黄棚板栗苗、泰山薄壳板栗苗、实生板栗苗、一年板栗苗、两年板栗苗、嫁接板栗苗、板栗树苗、板栗树。免费供应板栗苗栽培。走进生气勃勃的水仙栽培大棚，阵阵幽香而来，一朵朵雪白的水仙花秀丽绽放，心旷神怡。”沭阳县颜集镇康凯苗圃，座落于交通便当、美好、千古虞姬的桑梓，被誉名为“花木之乡”“绿化千佳村”的颜集镇。”专合社副社长余学根说，专合社正在中是按照市场代价，接纳“上不封顶、下要保底”的原则停止，以保障农夫的根基不受损伤，从而充裕了农人的莳植性。罗汉松市场被、的苗子严峻，市场空间赓续缩小，代价和销量都处于下滑当中。双季板栗栽种要面

一、建园密度株行距3×3米或3×4米，每亩56株或74株。

二、定植1、挖坑栽种坑为宽60 - 80公分，深度60公分以上，方坑圆坑都可。2、基肥定植基肥为20 - 40千克腐熟农家肥或肥，参加0.5 - 1斤钙镁磷肥，1斤花生麸（可用可不消）。如农家肥不敷，可用5 - 10千克农家肥 + 表层肥土 + 1斤生物肥 + 0.5斤钙镁磷肥 + 1斤花生麸（可用可不消）。3、定植定植前，用apt3号生根粉10万倍稀释液调制的泥浆水沾根，再定植。apt3号生根粉必需先用酒精消融再与水混淆。定植时，先将表土与肥料边混淆边放入坑底约1/2，再盖上新土，正在回填土达2/3时，可将钙镁磷肥与土边混淆边回填。起果盘高度15 - 20公分。回填后，挖一小坑，将果苗种下，并将果苗根系收拾整顿，不要向起，根系四周回填土必需细碎，以利于根系与泥土的接合，成活率。定植深度，以果苗原入土深度为好。回填终了，将苗向上提一提，再压实泥土，然后灌定根水。三、水板栗树根系兴旺，有菌根，比力抗旱，不耐涝，灌过2 - 3次定根水后，根基靠天雨，不是连气儿旱情，能够不淋水，但有水，则发展量及产量有较大。水的主要期为1、花前期，也就是4 - 5月份，此时好不要过早，不然对着花有影响。2、产果期，9 - 11月，此时缺水会降果和果实偏小。但此时适逢我区秋旱，能够用“固体水”等保水剂抗旱和保水。是正在树冠滴水线位置挖一环形沟，深30公分摆布，将保水剂与细土混匀后施入沟中，然后浇足水，用土将沟填平，以干品计，每树施用量幼龄树20 - 30克，成年树30 - 40克。也可穴施，是正在树干四周打孔或挖穴，深度20 - 30公分，将保水剂与细土混匀后涣散到每一个孔或穴中，浇透水后覆土。四、泥土越松散，板栗根系发展越好，板栗树一年需松土2 - 3次，普通夏、春季，详细说是正在次采果和第二次采果后，举行中耕松土锄草，连系施肥同时停止，松土深度20公分阁下，局限为树冠摆布20 - 30公分。五、肥1、一龄树定植出芽后，可用1000倍奥普尔停止叶面、天喷施次肥。过20天参加0.3%尿素再喷一次。因为4 - 6月份，板栗根系都还吃不到泥土中的基肥，正在5 - 6月可撒施一次硫酸钾型复合肥，用量50 - 60克/株或生物肥100 - 120克。施复合肥后，须用细土将复合肥笼罩，免得复合肥蒸发***果树

，撒施位置为果树树冠滴水线向外20公分处。如需采收昔时果实，需正在7月份叶面喷施1 - 2次500倍硼砂水和广欧化工院产的保果灵或产熏风赤1000倍保花保果和供应打果所需微量元素。幼果期、果实期各施一次500倍奥普尔叶面肥。11月份采收完后的板栗，须施一讲产后肥。沿果树树冠正在树的器械侧或南北侧开挖深50公分、宽20公分、长30公分坑，交杂草先填下坑再将5 - 8千克腐熟农家肥加上250克生物肥与土边混边回填，后用300倍奥普尔稀释液每株5斤水泼入便可。

2、第二年树正在4月份施一次花前肥，每株树天施200克生物肥，撒施同前。因为双季板栗为延续，继续挂果，对硼、锰、磷、钾、镁、钙的消费也响应较大，因而，从4月份起，每2个月施一次叶面肥，肥的配比为：硼砂500倍 + 保果灵一支 + 奥普尔500倍。次采果和第二次采果后分离松地皮施农家肥5千克，生物肥250克2次。11月份采收完后的板栗，施一讲产后肥。沿果树树冠正在树的器械侧或南北侧（上一年器械，往年南北）开挖深50公分、宽20公分坑，将杂草先填下坑再将10千克腐熟农家肥加上500克生物肥与土边混边回填，后用300倍奥普尔稀释液每株5斤水泼入便可。

六、修剪同病虫害及缺素症

1、修剪一样平常幼树经三年摆布可完成“天然形”或“骨干疏层形”树形、投产后分发展期、休眠期停止。发展期：4 - 11月，秋梢萌生后抹去萌蘖，秋梢30厘米长摘心，选留2 - 3个漫衍、方位、发展势强新梢，夏梢抽发后行摘心，充分的成绩母枝和了局枝。休眠期：12月 - 次年3月前剪去病虫枝、密生枝、纤细枝、穿插枝等对弱枝采纳多疏少留，对强树旺枝则多留少疏，徒长枝酌情剪留。对幼树、新梢中的竖立枝强行拉枝，可和缓顶端上风，增进侧芽萌生及花芽分化，有益于早结丰登。成年树及高接树得当回缩，以促发新梢，建立体成果。疏花疏果：第二季果常常偏多偏小，可正在8月中旬做疏花疏果，1个果枝保存2 - 5个雌花或幼果，将今后抹去，使两季成绩并大果型。