

中林1号核桃苗批发 中林1号核桃苗市场价格

产品名称	中林1号核桃苗批发 中林1号核桃苗市场价格
公司名称	泰安高新区北集坡凯欣园艺场
价格	7.00/棵
规格参数	厂家:泰安凯欣园艺场 地径:1cm 纯度:98%
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡街道办事处
联系电话	13583899905

产品详情

泰安开发区凯欣园艺场介绍中林1号核桃 中林1号核桃品种来源：中国林科院人工杂交良成。中林1号核桃坚果性状：坚果圆形，果基圆，果顶扁圆。平均单果重14克，壳面较粗糙，壳厚1毫米，可取整仁或1/2仁，出仁率54%。核桃充实，饱满面，中色。核仁含脂肪含量65.6%，蛋白质含量22.2%。中林1号核桃栽培习性：树势较强，树姿较直立，分枝力强，树冠椭圆形。果粮间作适宜密度6米×10米，园艺栽培密度5米×6米。在北京地区，4月中旬发芽，4月下旬雌花盛开，5月初雄花散粉。9月上旬坚果成熟。较耐旱，水肥不足易落果，花期遇雨易感褐斑病。适宜在华北及中西部地区栽培

整形修剪

6.1树形核桃树形以主干疏层形和开心形为宜。主干疏层形：第1层主枝留3个，错落着生在整形带部位。第4年选留1~2个生长健壮、角度好并和第1层主枝错开的2个枝作第2层主枝。第5—6年留1~2个枝为第3层主枝。每个主枝上选留2~3个侧枝。对各层主、侧枝上及层间中干上的分枝，在不影响树冠生长的条件下均可任其生长，结果后再行截、缩，培养成结果枝组。自然开心形：全树有3~4个生长旺盛的主枝，剪留长度50~60cm向四周生长。每主枝的两侧在3—5年内选留2~3个侧枝，同侧的侧枝距离为80~100cm，以便于培养结果枝组。在主、侧枝上着生的枝条其长度超过60cm时，可剪留40~50cm培养为结果枝组。这种树形适宜土层较薄的丘陵山地，成形快，结果早。

6.2整形修剪时期核桃落叶后即开始伤流，自11月中旬开始，到翌年3月下旬发芽时停止。伤流期内修剪会造成树体养分和水分流失，影响树体生长结果，因而不能在冬季修剪。修剪适宜期，结果树为核桃采收后至开始落叶前，幼树应在春季萌芽前后即3月中、下旬。6.3幼树和结果树的整形修剪定干后，整形带内可抽生3~5个生长健壮的枝条。翌年春季发芽前选顶端直立向上枝为中干，剪留长度为70~80cm，剪口下留饱满芽。其下的枝条为主枝，剪留长度为40~50cm，剪口芽应选留枝条上的侧芽，不用背后芽(若枝条直立可留背后芽)。以后逐年培养第2、3层主枝和侧枝。早实核桃优良品种在良好的栽培管理条件

下，7~8年树冠基本形成，进入初盛果期。对树冠内直立、交叉、重叠、下垂的枝条应及时短截或疏除，以保持树冠内良好的通风透光条件，利于果实和混合芽的生长发育。进入结果期后，可隔年修剪1次。对树冠内枯枝、雄花枝、衰弱枝应疏除和更新。对各级主侧枝的延长枝可行短截和回缩。7肥水管理为促进核桃幼树生长和早期丰产，除定植时株施有机肥15~25kg外，应在发芽前、花后、幼果膨大期、硬核期追肥。3年生以前每次株施复合肥或尿素0.1~0.25kg；4~10年生每年株施复合肥或尿素每株1~2kg。施肥前距树干10~20cm挖放射沟4~6条，沟长与树冠相等，宽、深各5~10cm，将肥料撒入沟内与土拌匀覆土，随后管水。在无灌溉条件的核桃园可于雨前施肥。栽植4年后，每年秋季采收后株施土杂肥25—50kg；放射状沟施，沟深20~30cm、宽30cm为宜。有灌溉条件的核桃园，发芽前、花后、硬核期、核仁发育期结合追肥管水，10月下旬施基肥后管水，全年管水4~5次。