

早露樱桃苗种植前景 早露樱桃苗成苗报价

产品名称	早露樱桃苗种植前景 早露樱桃苗成苗报价
公司名称	泰安高新区北集坡凯欣园艺场
价格	10.00/棵
规格参数	厂家:泰安凯欣园艺场 地径:0.8cm 纯度:98%
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡街道办事处
联系电话	13583899905

产品详情

泰安开发区凯欣园艺场介绍早露是甜樱桃品种那翁自然实生,2012年通过辽宁省非主要农作物品种审定委员会审定。果实宽心脏形,紫红色,平均单果重8.65 g,大果10.17 g。黏核,果肉天竺葵红色,肉质较软,汁液多,风味酸甜适中,鲜食品质上等。可溶性固形物含量为18.9%,可滴定酸含量为0.34%,维生素C含量99 mg/kg,可食率93.1%。在大连市果实5月末至6月初成熟,比红灯早熟8~-10天,果实发育期35 d左右。抗樱桃流胶病,用马哈利作砧木结果早,抗性强。早露在辽宁省瓦房店市以南至云南、四川高海拔地区和陕西、甘肃等地均可栽培。该品种自花不实,生产上可配置红灯、红艳等做授粉。

采用遮阳网栽培

露地栽培的盛果期大樱桃,在开花期和盛夏(7月上中旬至8月下旬)。采用遮阳网遮光,避免温度过高。在开花期遮光,由于叶片尚未彻底展开,此时开花结果主要依靠上一年的贮藏养分,因此,遮光对叶片的光合作用及开花结果影响不大。

别府贤治等人的试验结果表明:夏季温度较高的年份(遮光率53%)和夏季温度高的年份(遮光率78%),均能显著降低2根雌蕊花的比率;试验还表明:夏季用遮阳网遮光,不仅没有降低光合速率,反而提高了光合速率,抑制了叶片日灼的产生,增加了树体的贮藏养分,延长了翌春胚珠的寿命,提高了坐果率。在夏季同时要注意及时灌水,防止土壤干燥,以利花芽分化。

3、施用硼肥和生长调节剂

用赤霉素的拮抗剂-多效唑(500毫克/千克),在开花前进行喷布,可延长胚珠的寿命,提高坐果率;在缺硼的大樱桃园,秋季土施或喷施嘉美金硼,也可延长胚珠的寿命,提高坐果率。

另外在萌芽期及时补充有机活化营养，可以补充树体储存营养，局促花器官发育完好，也利于提高坐果率。但利用这些调节措施只是辅助手段，其根本关键在于控制开花期和盛夏温度的过高。