

# 美早樱桃苗价格

产品名称	美早樱桃苗价格
公司名称	泰安开发区荣敏园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	品种:美早樱桃苗批发 规格:1厘米 地区:泰安开发区荣敏园艺场
公司地址	山东省泰安市徂汶景区滨河片区北店子村（经营场所）
联系电话	0538-8928669 18765380039

## 产品详情

布鲁克斯樱桃苗从美国引入品种，5月中旬成熟，果实扁圆形，平均单重9,4克，顶果重13克，果实浓红色，油亮光泽，果柄短粗，果肉紫红色，肉质脆硬，汁液丰富，含糖量17%，酸度低，口感好，风味极甜，需贮运，5度以下可贮藏30天以上，露地保护地栽培皆宜，栽可与早大果，红灯，美早，互为授粉,产量高，品质优 红蜜樱桃苗：全生育期95天左右,蔓较粗,果实圆正，黄皮、光滑，果肉淡红，肉厚5—5,5厘米,红蜜的坐果率高，是丰产型品种,果实中等大小，平均单果重6,0克，均匀整齐，果型为宽心脏形,果皮黄底色，有鲜红的红晕，光照充足的部位，大部分果面呈鲜红色,肉质较软，多汁，以甜为主，略有酸味，品质上等,可溶性固形物为17%,核小粘核，可食部分占92,3%,成熟期在5月底至6月上旬，比红灯晚4~5天，果实发育期40~50天 建园 我国栽培的甜樱桃品种主要为欧美品种，在我国北方地区表现很好，由于欧洲甜樱桃一般需7,2度以下低温900~1400小时方可完成冬季休眠，限制了在我国南方的大面积栽培,因而，在我国南方地区仍以樱桃为主栽品种，所以如果引种一定要看本地的需冷量是否满足，不可盲目引种，在目前浙江大面积栽培中，诸暨短柄和黑珍珠两个品种可作为，诸暨短柄樱桃成熟期一般在4月中下旬，黑珍珠在五一前后，两个品种可以互相搭配，延长成熟期适时灌水 有条件的樱桃园，应在早春萌芽前和落叶后土壤封冻前共浇2次透水,无条件的应做好深翻熟化土壤，和树盘覆草，以充分保水，维持一定产量,樱桃栽培技术 樱桃为蔷薇科桃李属樱桃亚属植物,樱桃原产我国，主要分布于黄河流域和长江流域，是落叶果树中早成熟的一种果树,暮春初夏，樱桃先百果而熟，赢得了“春果枝”之美誉,其以果实早熟应市独占果品淡季市场，经济效益一直较高，被列为果中珍品,俗话说：樱桃好吃树难栽，多数农户和果园因品种，砧木选择不当，栽培管理技术落后 黄蜜樱桃苗：该品种长势中庸，易形成花芽，如管理得当二年可见果，2月上旬开花，5月下旬成熟，一般单果重10克左右，果肉透亮，风味佳的蜜甜型优良品种，自花结实，丰产并可做授粉树,适宜北方地区、西部山区及保护地栽培,亩产可达1500公 提高成活率要点 栽前树穴改良时应掺入充分腐熟的有机肥和适量的复合肥，以促进新根的生长,好在春暖后，即土温已上升到10度时栽植，以利栽后及时生根,新栽樱桃树后应浇透水并立即地膜覆盖树盘，有利于土温上升和新根生长，尽快解决吸水与散水之间的不平衡，提高成活率，加强早期生长，缩短缓苗期 直立压条：秋季或早春将大樱桃砧木苗定植在繁育圃中,定植时首先按1-1,5米的行距挖深30厘米左右的沟，再按50-60厘米的株距将砧木苗栽入沟内，其根颈要低于地面,砧苗萌芽前留5-6芽剪截，待芽萌发新梢长到20厘米左右时，进行1次培土，厚约10厘米，新梢长至40厘米时再培土10厘米,每次培土后均应追肥、灌水,以后加强综合管理，并根据情况适当培土，秋季落叶后，即可扒土分株 板片芽接这种方法全年均可使用,嫁接用砧木

粗度应在0.7厘米以上，接穗宜采集1年生枝，选用饱满芽作接芽，嫁接时，在砧木基部距地面10厘米左右处，选择光滑的部位，沿垂直方向，轻轻削成长2.5厘米左右、深2毫米左右的长椭圆形削面，切削接芽时，在接芽以下1.5厘米处下刀，将芽片轻轻从接穗上削下，削成长2.5厘米，厚2毫米左右的长椭圆形芽片，然后将芽片紧紧贴在砧木的削面上，用塑料薄膜带包严绑紧即可。玛瑙红樱桃苗以其熟透的果子红中透紫，像晶莹剔透的红玛瑙而得名，玛瑙红樱桃果形心脏形，色泽度紫红艳丽，风味佳，品质上乘，其可溶性固形物为15.75%，可溶糖为11.886%，可滴定酸为每百克含量7.5摩尔，维生素C每百克含量为22.578毫克，平均单果重4.2克，大6克，以其营养丰富，香甜可口，被誉为排毒养颜美果，市场价每公斤20元以上。

俄罗斯8号大樱桃，又名含香，果实宽心脏形，宽大，有胸凸，成熟时果实颜色从鲜红色渐至黑紫，油润黑亮，果肉甜，果柄细长，果个较大，平均单果重12.9克，果皮厚韧，弹性强，甜香味浓，大连地区6月上旬开始成熟，既适于我国现有樱桃产区栽植，又可以向适栽区以北较寒冷的地区发展，俄罗斯8号甜樱桃风味香甜，大樱桃丰产性强。建园我国栽培的甜樱桃品种主要为欧美品种，在我国北方地区表现很好，由于欧洲甜樱桃一般需7.2度以下低温900~1400小时方可完成冬季休眠，限制了在我国南方的大面积栽培，因而，在我国南方地区仍以樱桃为主栽品种，所以如果引种一定要看本地的需冷量是否满足，不可盲目引种，在目前浙江大面积栽培中，诸暨短柄和黑珍珠两个品种可作为，诸暨短柄樱桃成熟期一般在4月中下旬，黑珍珠在五一前后，两个品种可以互相搭配，延长成熟期。吉塞拉樱桃苗早实丰产性能：现有生产中用的樱桃和山樱桃砧木均为乔化砧木，因此造成樱桃树体高大，管理困难，定植5年以后才能见果，10年以后才能有较大收益，甜樱桃品种嫁接在吉塞拉5号、6号砧木上，表现早实性强，产量效率高，可以比常规砧木提前2年结果。

美早樱桃苗：树势强健，树姿半开张，果实大，平均单果重9克左右，果形宽心脏形，大小整齐，顶端稍平，果柄特别短粗，果皮全紫红色，有光泽，鲜艳美观，充分成熟时为紫色，果个略大于红灯，风味比红灯好，果型宽心脏形，大小整齐，果顶稍平，果柄较粗短，具有果柄粗长，肉硬，耐贮运，花期耐低温，腋花芽多，丰产，裂果，成熟期一致，一次即可采收完毕等特点，是一个果大、质优、肉硬、耐贮运、丰产的早熟樱桃的品种。适时灌水 有条件的樱桃园，应在早春萌芽前和落叶后土壤封冻前共浇2次透水，无条件的应做好深翻熟化土壤，和树盘覆草，以充分保水，维持一定产量。

樱桃栽培技术 樱桃为蔷薇科桃李属樱桃亚属植物，樱桃原产我国，主要分布于黄河流域和长江流域，是落叶果树中早成熟的一种果树，暮春初夏，樱桃先百果而熟，赢得了“春果枝”之美誉，其以果实早熟应市独占果品淡季市场，经济效益一直较高，被列为果中珍品，俗话说：樱桃好吃树难栽，多数农户和果园因品种，砧木选择不当，栽培管理技术落后。