

蛇果树苗怎么卖，出售蛇果嫁接苗

产品名称	蛇果树苗怎么卖，出售蛇果嫁接苗
公司名称	泰安市广祥农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广祥农业 型号:嫁接苗 产地:山东
公司地址	山东泰安高新区北集坡镇
联系电话	0538-8912686 13954886187

产品详情

蛇果树苗怎么卖，出售蛇果嫁接苗

苹果可以说是大家生活中离不开的水果之一，富含丰富的维生素和晒是纤维，特别适合老人和小孩食用。我国苹果栽种是比较广泛的，因为各地气候等因素有所差异，所以种植的品种也不同。苹果种植过程中夏季果园的管理是十分关键的，尤其是要掌握相应的技术要点。

1、不要浇大水

夏季是果树需水量和蒸腾量最大的季节，需要及时补充水分，但不宜大水漫灌。因为大水漫灌易引起树体旺长，造成大量毛细吸收根窒息死亡。大水漫灌后虽然土壤含水量大，但土壤空隙中的水分过剩会造成根系缺氧，毛细根死亡，水分调运受阻，从而导致叶片蒸腾缺水，造成烧叶或叶片萎蔫现象。因此，果园什么时候浇、怎样浇、浇多少，要看天、看地、看果量、看树势。如果树势稳、果量大、天旱无雨地墒差，浇水后既不冒条，又能膨果，还能育花。以渗灌、沟灌、穴灌、滴灌或用冲施肥施灌效果最佳。

2、要及时的追肥

肥是树的“粮”，水是树的“汤”。6—7月追肥灌水，肥多水少，树势壮而易成花;水多肥少，新梢虚旺难成花。

多数果农认为，果要长得大，水为王，肥为粮。在施膨果肥时往往选用高氮高钾复合肥并进行大水漫灌，导致果树不能及时停长，花芽分化少，大小年结果严重，果子成熟晚，色差味淡，品质下降。正确做法是夏季增施磷、钾肥或低氮中磷高钾肥和微量元素肥，以保证果子着色好，个大卖相好。

3、不要旋耕除草

套完果袋后，不少果农把地旋耕得干干净净，寸草不见，土干气燥。事实上，果树生长期深翻树盘会大量损伤5~20公分的浅层吸收根，使这些生长最活跃、对温度湿度最敏感、吸收养分水分和合成细胞分裂素能力最强的吸收根不能充分发挥作用，花芽难以形成，果实糖度低、色泽差。另一方面，旋耕太深会伤害表层吸收根，更有利于深层生长根发育，刺激秋梢生长，形成虚旺树。同时，7月份正值三伏天，气温高于30℃就会加快根系和叶片的呼吸消耗。生草果园的地表温度比清耕果园低3~5℃，多年生产实践表明，4—8月果树生长期频繁的机械旋耕，实为“认认真真犯错误，踏踏实实搞破坏”的无益之举。

果树生长期地下管理的原则是免耕、生草、覆草。自然生草切莫形成“荒草园”，草生长过高要及时刈割并覆盖在树盘下。因为草是自生自养的有机肥，是温度水分的调控器，调控好就能变害为利。

4、不要梳枝太多

夏剪是促成花芽形成的有力措施。有果农把背上新梢剪了一地，本想改善树体光照，实际上却破坏了根冠平衡关系，导致“背上剃光枝晒伤，裸露幼果受日灼，停长枝芽又生长，花芽分化受影响”。背上枝过密，可保留“叶大、节短、封顶快”的强旺新梢，适当疏除部分“枝嫩叶黄节间长”的徒长枝和虚旺枝。对不能适时停长的新梢，可间断扭梢，堵长促壮。对“冲顶破芽”的新梢，可掰除顶芽，抑顶促萌。