

3公分血桃树苗，血桃树苗价格

产品名称	3公分血桃树苗，血桃树苗价格
公司名称	泰安市广祥农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广祥农业 型号:3公分 产地:泰安
公司地址	山东泰安高新区北集坡镇
联系电话	0538-8912686 13954886187

产品详情

桃树种子应该在什么时间种植？

桃树种子最佳的播种时间四每年的10~12月份，但是北方地区秋季种植的时候需要桃树种子注意预防被冻死。当然了，春天也是可以播种的，种植的时间一般是春季1~3月，但是种子必须是处理过后的，也就是：沙藏过后的种子。种子播种的时候在30度到40度的温水里浸泡四小时，让种子充分吸收水分之后在进行播种。总结如下：

秋种一般在秋季落叶后（其实应该进入冬季了），土壤上冻前一段时间比较好，基本没有缓苗时间，有利于提早春季萌芽，树的长势也比春天栽的旺些；

春种一般在春天土地解冻后及桃萌芽以前，因为定植后根系开始生长还需要一段时间，相当于缓苗，早期生长会稍慢些，但越过了冬季低温，不会造成冻害。

二、如何提高桃树种子的发芽率？

主要有以下几种方法：

- 1) 选择颗粒饱满，处理好的桃树种子。
- 2) 选择地势平坦，阳光充足，排水系统良好的土地播种。
- 3) 种子下地之前用温水把种子泡72个小时。
- 4) 提前把地整平，并且清理杂草，土蛋，石块。
- 5) 种植深度保持在3公分左右，种子下地以后立马浇水。

然后等桃树慢慢长大吧，适当的施加复合肥或者有机肥，一般两年后即可移栽出来。

三、桃树移植和施肥

桃树移植建议在落叶后至第二年三月份以前移栽，根据“秋栽先发根，春栽先发芽，先栽几个月，生长赛一年”的实际经验，建议秋栽为好。另外注意以下几点：

- 1) 提前挖好树穴，移栽前进行适度修剪（留枝量1/2左右），尽量多留根，栽植后立即浇透水（以后每隔7-10天浇一次水），大树要设立支柱防止倾斜；
- 2) 定植后用70%恶霉灵5000倍淋定植水，既可加快返青发育，又可有效预防多种病害；
- 3) 前期施肥：定植后用70%恶霉灵5000倍淋定植水，既可加快返青发育，又可有效预防多种病害。
- 4) 后期施肥（长大之后）：桃树对氮、磷、钾的需要量，成年树每产100公斤果实，约需氮0.5公斤、磷0.3公斤、钾0.6公斤，比例约为1:0.6:1.2。秋施基肥时，桃树断根在较短时期即可愈合，并发出新根，有利于营养的贮藏，秋施基肥可在落叶前结合秋耕进行。

四、桃树嫁接时间

桃树进行嫁接的时间一般选择在春、夏、秋三季进行，而春季最为适合。一般时间春季在3月份进行，夏季进行嫁接的时间一般在每年的5月份到8月份这段时间，秋季在9月中旬进行，过早易产生流胶，过迟温度太低不易成活。而一般的农民都喜欢春夏两季嫁接。

春季嫁接：2月中旬至4月底，此时砧木水分已经上升，可在其距地面8-10厘米处剪断，用切接法嫁接上品种接穗即可。此法成活率可达95%以上。

夏季嫁接：从5月中旬至8月上旬，此时树液流动旺盛，桃树发芽展叶，新生芽苞尚未饱满，是芽接的好时期。

秋季嫁接：7月下旬至9月下旬，此时当年新生芽苞叶片已成，可削取带有叶柄的接穗进行芽接。

冬季嫁接：从11月初至翌年1月底，砧木树液已经停止流动，此时可采用根茎嫁接法。

五、桃树的嫁接的2种方法

嫁接的方法可以根据情况进行合理的选择，目前较为稳妥的嫁接桃树是砧木嫁接、芽接2种方法。

1) 砧木嫁接：

一般多会选择毛桃树，毛桃树不仅和桃树的亲和力强，并且毛桃树的根系发达，并且耐贫瘠，在我国大部分地区都有分布。用毛桃树作为砧木的经济效益更加好。嫁接时间是三月中旬进行。选择合适的桃树砧木，适合作为砧木的毛桃树树龄最好是在0.5公分以上的毛桃树。接穗需要选择树龄比较大的优质桃树上的枝条作为接穗，接穗的品质必须优良，这样嫁接的结果才会比较理想。接穗需要是优质桃树上的一年生的新枝条，并且接穗必须是健壮没有病害的，花芽饱满等。

具体方法：首先先要在桃树的砧木上面选择一处生长比较好的芽包，将砧木上面的芽包环剥下来，接着再将接穗上面找一个同样大小的芽包环剥下来，将接穗上面环剥下来的芽包贴在砧木上面，然后用塑料袋包扎紧。注意环剥的时候一定不要伤及砧木的木质，并且接穗上的环剥下来的芽包不能够有损坏。完

成之后将砧木上面的其它的芽包都抹去。