

# 玻璃温室大棚蔬菜田的管理

产品名称	玻璃温室大棚蔬菜田的管理
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

# 玻璃温室大棚蔬菜田的管理

### (1) 温度管理

播种后一星期内不得通风，主要用于保温，尤其是茄子和黄瓜，应保持高温，以利于幼苗。幼苗后，应保持高温。番茄幼苗在白天在20-25 °C和晚上在10-15 °C适度生长。茄子生长的合适温度为20-30 °C。当温度低于15 °C时，将导致授粉和不育。甜（辣）辣椒的生长温度为25-28 °C；黄瓜温度为28-30 °C，夜间温度不能低于10 °C，5月中下旬温度逐渐升高，可以逐渐移开裙边，在苗期不露膜。通风时间为9点至10点，下午15点后关闭覆盖膜。

### (2) 肥料和水管理

播种和育苗后，用稀薄的人类排泄物或牲畜脂肪施肥。  
番茄，穗果膨大期1个，复混肥10公斤/亩；二个-3穗果开始膨大期，复合肥30公斤/亩；第四-5穗果期开始扩大期，复合肥20公斤/亩。  
2施用甜（辣）辣椒苗后，在整个生长期保持田间湿润，但应干燥，无水，稀薄的肥料并勤加施用。通常，每次收获肥料两次，复合肥料为10千克/亩，施肥量增加20千克/亩。  
茄子追肥与胡椒类似，每次收获黄瓜两次。

### (3) 铆接和修剪

将西红柿和黄瓜插入竹子中以支撑植物，并将葡萄藤放在架子上，这对结果很有帮助。对于番茄，使用双杆修剪方法，保留在花穗上方的侧芽，并去除随后的腋芽和分支。茄子花和水果的一分支留在了后面，其他所有的都除去了。甜（辣）胡椒的开花结果非常规律。当生长和开花结果过强且植物生长潜力较小时，去除上部的花朵和果实，以促进下部花朵的正常生长。

#### (4) 保鲜花果

春季气温较低，西红柿，两个穗状花序需要使用激素来保护花果，以增加早期产量，并使用40PPM防止花序梗；茄子在开花（喇叭花）前1-2天点花或喷洒抗坠落15PPM；辣椒也可以喷洒抗堕胎剂。

花果保鲜处理应在低于15 ° C，高于15 ° C的温度下进行，如果光线充足，则不应进行处理。浓度应严格控制，不要过高，以免产生副作用。

青州誉鑫源温室，我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖温室及各种温室大棚等；还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型，外观造型美观，内部视野开阔，宽敞明亮。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细报价请联系客服！