

中油21桃苗供应 安阳中油21桃苗 超顺苗木

产品名称	中油21桃苗供应 安阳中油21桃苗 超顺苗木
公司名称	泰安超顺苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区马庄镇北苏村
联系电话	13953803397

产品详情

油桃新品种的各类特征有哪些?

(1)紫金红2号 江苏省农业科学院园艺研究所霞光为母本，早红宝石为父本杂交培育而成。果实圆形，平均单果质量174.2克，大单果质量243克。果顶圆平，缝合线浅，两半部较对称，梗洼中广。果皮光滑无毛，底色黄色，着色艳丽，近全红;果肉黄色，硬溶质，纤维少，风味甜，有香气，黏核。无裂果现象。

树体健壮，长势中庸。复花芽多，成花率高，自然坐果率36.2%，结果性能良好。种植后第2年即有少量结果，盛果期每667米²产量1867千克左右，早果、丰产。在南京地区，3月上中旬萌芽，3月下旬始花，花期持续5-7天。果实6月下旬成熟，果实生育期95天左右。

(2)中油12号 中国农业科学院郑州果树研究所选育。果实近圆形，果顶圆;缝合线浅而明显，两半部较对称，成熟度一致。平均量103克，大单果质量大于170克。果皮光滑无毛，底色乳白，80%果面着玫瑰红色，充分成熟时整个果面着玫瑰红色或鲜红，有光泽，艳丽美观。果皮厚度中等，不能剥离。果肉白色，软溶质，风味浓甜，有香气。黏核。

树势中等偏旺，中油21桃苗厂家，树姿较直立，枝条萌发力中等，成枝率高。郑州地区，正常年份3月上旬萌动，3月下旬开花，5月25-31日果实成熟，发育期约60天。

(3)龙峰中油4号的芽变。果实近圆形，果形端正，平均单果质量180.3克，果实大小整齐。果皮鲜红色，着色面积93%以上，色泽艳丽;缝合线浅。果皮厚，半离核。果肉黄色，硬溶质，肉质细、密，有香气，风味甜，品质上等，耐贮运。

树势中庸，树冠紧凑，枝条易下垂。成花容易，以短果枝结果为主。在山东省潍坊市，中油21桃苗哪家好，3月中旬萌芽，4月上旬初花，4月中旬盛花，花期7天左右，果实初采收期6月中下旬，果实发育期70天左右。

(4)中油4号中国农业科学院郑州果树研究所用25-17X五月火杂交选育而成。果实椭圆形至卵圆形，平均单果质量148克。缝合线浅。果皮底色黄，全面着鲜红色至紫红色，果皮难剥离。果肉橙黄色，硬溶质，肉

质较细，风味甜。黏核。

树势中庸，树姿半开张。发枝力和成枝力中等。以中、短果枝结果为主。花粉多，极丰产。在郑州4月初开花，6月中旬果实成熟，果实生育期80天。

(5)中油5号中国农业科学院郑州果树研究所用25-10X五月火杂交选育而成。果实短椭圆形或近圆形，平均单果质量166克。果顶圆，偶有突尖，缝合线浅，两半部稍不对称。果皮底色绿白，大部分着玫瑰红色。果肉白色，硬溶质，果肉致密，风味甜。黏核。有果顶先熟现象。

树势强健，树姿较直立；萌芽力和成枝力强。各类果枝均能结果，但以长、中果枝结果为主。花粉多，丰产。在郑州4月初开花，6月中旬果实成熟，果实生育期72天。

在桃树枝条的1个节上，只着生1个花芽或1个叶芽的，称为单芽；着生2个以上的，称为复芽。在复芽中，凡是2个芽并生时，多为1个花芽和1个叶芽；3个芽并生时，则中间的芽为叶芽，两旁的芽为花芽，偶而也有3个都是叶芽的；有4个芽并生时，也是叶芽居中，两旁是花芽。如果营养不足或遭受机械损伤时；可能有节无芽，这种节称为盲节，修剪时不能剪在盲节上。

单芽和复芽在枝条上的排列顺序，以及叶、花芽的组合，因品种和果枝类型的不同而有差别。桃树的芽具有早熟性，所以，生长期长和环境条件适宜的地区，1年内可抽生3~4次副梢，甚至更多，而形成多次分枝和多次生长的情况。这对加速成形和提早结果提供了有利条件，整体修剪时应注意利用这一特点。

桃树的寿命不长，所以潜伏芽寿命也较短，萌发更新的能力也较弱，其萌发能力一般只能维持1~2年，在重剪刺激的情况下，10余年的潜伏芽也能萌发。所以，桃树容易衰老，中油21桃苗供应，更新也比较困难，这也是桃树的整体修剪不同于苹果、梨之处。

桃树的萌芽率和成枝力，虽与品种和长势有关，但均强于苹果和梨。一般北方品种群的桃树，萌芽率比南方水蜜桃品种弱；早生水蜜桃的萌芽率低，但成枝力强；天津水蜜桃的萌芽率高，但成枝力弱。

桃树在正常的栽培管理条件下，萌芽率高、成枝力强的品种，成形快，结果早，产量也高。在这类品种的主梢上，很易萌发多次副梢，萌发较早的副梢，当年还可能形成花芽，树冠内外的枝条也比较稠密，因而成形也快。

同时采果后进行深翻，并结合施基肥，基肥以有机肥为主，施用量为产量的2~3倍。桃树比较耐干旱，生长中后期雨水较多，如不特别干旱，可不浇水，以免引起徒长，影响花芽分化。但在封冻前一定要浇封冻水。桃树不耐涝，桃园短期积水，就会造成黄叶、落叶，甚至烂根死树，因此，汛期应注意排除积水。

秋季修剪。桃树采果后，大部分品种正值高温多雨季节，新梢生长量大，形成副梢能力强，易造成内膛郁闭，影响花芽分化，应进行秋剪。对于树冠上部的强旺枝或枝组，可在疏去强梢后，自基部扭伤、下压；对于竞争枝，可采用扭作的办法控制其生长，使其向结果枝转化；重叠枝、交叉枝及老弱枝组要及时回缩；过密枝、细弱枝及无用的直立旺枝要疏除；对于有空间保留的直立旺枝，可下压在冠内，缓和其长势。

三、病虫害防治。

中油金帅，原代号9-5。果实近圆形，果顶平、偶有小尖，安阳中油21桃苗，茸毛少。果面可全红，套袋果实金黄，外观美，果肉金黄，单果重200克左右，大果300克以上。味浓香甜，可溶性固形物14-16%。在山东地区果实8月上中旬成熟。自花结实，极丰产，是一个综合性状优良的中晚熟黄肉桃新品系，可引种试栽。栽培时，应注意严格疏花疏果，以获得更理想的果重。平均单果重80克，鲜红色，果肉白。硬溶质，离核，核小，不裂果，口感纯正，浓香浓甜，果实含糖量22%，有冰糖大枣味，售价极高，成花容易，极丰产，结果如红枣一串串，密如繁星。

中油21桃苗供应-安阳中油21桃苗-超顺苗木(查看)由泰安超顺苗木专业合作社提供。行路致远，砥砺前行。泰安超顺苗木专业合作社(www.tachaoshun.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!