

洪建苗木 榉树苗木 苏州榉树苗

产品名称	洪建苗木 榉树苗木 苏州榉树苗
公司名称	句容市茅山镇洪建苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇永兴村宋家棚自然村23号
联系电话	13913264941

产品详情

红叶石楠病害有灰霉病，主要危害枝条顶部的嫩叶和幼茎，叶片和果实。可用50%的多灵菌800倍溶液浓度喷洒。叶斑病只要危害红叶石楠的叶和茎，会出现褐色小点，和灰霉病都可用多灵菌喷洒。病的出现会造成红叶石楠只生根不发芽，榉树苗批发，影响它的生长，榉树苗木，可用70%的托布津可湿性加500到100倍溶液喷色防治。

虫害有蛀虫、介壳虫、红蜘蛛、吉丁虫、刺蛾虫、天牛，当出现虫害的时候红叶石楠的嫩叶会出现成片的虫洞，易患虫害的季节在每年的初夏的时候。温度逐渐升高，虫卵孵化很多小虫出来，每年可在初夏来临前用40%的乳800倍溶液喷洒整片栽植的红叶石楠，做提前预防工作。

桂花树常绿植物，和落叶科植物相比较它的栽植技术要高一些。除灌木植物四季桂和五彩桂和小苗桂花树移栽是不需要带土球的。米径3公分以上的桂花树种植都是需要带土球栽植的，工程栽植桂花树统一分枝点、统一树冠和米径大小。公园栽植的丛笼桂花树要求树冠和高度一致，冠幅饱满密实。项目工程栽植桂花树所选栽植土必须是中性或弱酸性土壤，春秋冬季种植桂花树存活率高，夏季高温种植桂花树需修剪一部分桂花树的树冠或抽枝。行道树栽植的高杆桂花速需用撑杆固定，定时少量浇水避免根部积水。

红叶李主要的繁殖方法分为两种，扦插和嫁接繁殖法，扦插适合批量繁殖小苗，嫁接适合高桩嫁接到其它的大树上面，一年可分两次扦插，可在春季或者是秋季10~12月份进行，苏州榉树苗，可在成年的大树上挑选部分嫩枝做扦插条，需为木质化的枝条，长度为10cm左右，上面可以没有叶片，榉树苗，但是要有发芽嫩口哦。沙性土壤排水性好，出芽率很高，也可将小扦插条在生根粉水里面浸泡后再扦插出芽率还要高一些，春季可露天扦插，秋季需盖薄膜扦插保温和保湿哦。

用红叶李的小嫩芽嫁接到其它品种的树上比如独杆或者是高杆嫁接，存活后可直接当做乔木树培育，种植的时间也是可在每年的春季进行，用当年新生长的嫩芽嫁接到生长健壮比较粗壮的杏树、李子树、山杏、毛桃树、紫叶李树等，这些都是可以用的，一般我们会选择主杆笔直比较粗壮的做母树，后期也是能培育出较好的树形。

洪建苗木(图)-榉树苗木-苏州榉树苗由句容市茅山镇洪建苗木种植园提供。句容市茅山镇洪建苗木种植园

(jrjmm.cn) 在花木这一领域倾注了无限的热忱和热情，洪建苗木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贡洪建。