

桃苗新品种 桃树苗 青州大丰收苗木合作社

产品名称	桃苗新品种 桃树苗 青州大丰收苗木合作社
公司名称	青州市大丰收苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州谭坊镇宫家村
联系电话	15063681666

产品详情

1.桃树苗病虫害发生时期早，种类多

设施桃树在冬春季生产，病虫害比露地提前30-90天发生为害，并且露地病虫害都可能在设施中发生，优良桃树苗价格，但种类和发生程度不同。如在露地极少发生的灰霉病，在设施桃树上普遍发生较重。设施管理不当，则可引起水分、营养、激素失调，造成各种缺素症和裂果、落果等多胜病

2.防病难度大，易发生药害

由于设施桃树病害种类多，有的症状不标准，果农难以分辨，盲目用药，防效差;如遇连阴天或雨、雪天，则易失去最佳防治时机，造成病害流行。设施内湿度大、蒸腾拉力不足、施肥量大、丰缺不匀，易发生缺素症，并且容易与有些病害相互混淆，不易分辨，给防治带来困难。多数果农为提高防治效果，不断提高农药浓度，增加喷药次数;因设施桃树枝叶幼嫩，抗药性差，药害事件时有发生，造成大量落叶、落花、落果，损失很大。

为害状杏星毛虫属鳞翅目，斑蛾科。又名桃斑蛾，俗名红肚皮虫。可为害桃树苗、李、樱桃、梨等果树。以幼虫食害芽、花和嫩叶，杏芽被蛀食后，迟迟不能发芽开花，桃树苗，展叶后幼虫可吐丝缀叶为害。

形态特征成虫体长8~10毫米，翅展23毫米左右，全体黑色，有黑蓝色光泽，翅半透明，翅脉和边缘黑色。老熟幼虫体长15~18毫米，头褐色，体背面暗紫色，腹面紫红色，每节有6个毛丛，白色。

发生规律每年发生1代，以初龄幼虫在老树皮裂缝中做白茧越冬，翌春2月底，当

杏花芽尚未萌动时即出来蛀食芽，在芽旁蛀有针孔小洞，桃树苗批发，芽即不能萌发，严重时整个枝条不萌芽，花期为害花和嫩叶，幼虫白天藏在背阴树干缝隙中，傍晚上树为害。5月幼虫老熟，桃苗新品种，在叶背、树皮上和土中化蛹，蛹期15?20天，成虫羽化后在叶片背面产卵，卵期12~14天，幼虫孵化后咬食叶肉，为害不久即潜伏越冬。

防治方法

(1) 冬季刮老树皮，消灭越冬幼虫。

(2) 在越冬幼虫出蛰期喷药防治，可喷洒50%杀螟松乳油1000倍液，或20%戊菊酯乳油2000倍液，或52.25%农地乐乳油2000倍液。

(3) 成虫羽化期，人工捕杀成虫。

桃树苗骨干枝

骨干枝由主干、主枝、侧枝和中心干构成。其中，主干是指第1分枝以下的树干。着生在主干和中心干上的永久性枝条称为主枝。侧枝是着生在主枝上，从属于主枝的固定的骨干枝，设施栽培桃树树冠较小，一般不留侧枝，主枝和中心干上直接着生中、小型枝组。

辅养枝

辅养枝也称临时性枝，在树冠形成过程中，起着辅养树体、增加结果部位的作用。对于定植当年的幼树，树体较小，要多留辅养枝，增加枝量，提高第1年的产量，但辅养枝不能超过主枝的生长势。第二年采果后，随着树冠的扩大，对影响骨干枝生长的辅养枝要回缩或疏除。对辅养枝的处理要“影响(骨干枝)一点去一点，影响一段去一段，全部影响连根片(疏除)”。

桃苗新品种-桃树苗-青州大丰收苗木合作社由青州市大丰收苗木专业合作社提供。青州市大丰收苗木专业合作社（www.taoshu-miao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.dfstm.taoshu-miao.com）还是从事晚熟桃树新品种，潍坊晚熟桃苗，山东晚熟桃树苗基地的厂家，欢迎来电咨询。