

丹徒区榉树小苗 洪建苗木 句容榉树小苗

产品名称	丹徒区榉树小苗 洪建苗木 句容榉树小苗
公司名称	句容市茅山镇洪建苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇永兴村宋家棚自然村23号
联系电话	13913264941

产品详情

红枫在每年5~6月份的时候需注意其注意真菌侵染，特别是规格较小1~3公分左右的，如果是种植地区密度过大和湿度控制不好的话很容易患真菌的，如果是单株间的栽植间距充足，在高度30cm的土箱种植，做到良好的通风和排水工作是可减少真菌发生的，可用50%多菌灵或者代森锌65%按比例加上后喷洒全株哦。

每年的5月份的时候是红枫树生长新叶的季节，易出现叶蝉虫，它们会吃掉这些新叶，严重的会出现顶部叶片光秃秃的，可用40%的氧化容易喷洒，虫害还有刺蛾和蛀干虫害等，其实大部分时候用肉眼也是能观察出它的叶片和枝干有无异常，健康生长的红枫树颜色为红色，表面光滑，主杆嫩枝树皮也是光滑的，如有异常可用除了哦。

无患子繁殖方法有播种繁殖和扦插繁殖，这两种方法都可用于培育繁殖。播种繁殖需在每年的十月份收集成熟的果种，挑选颗粒饱满生长健康的果实用于母本培育。种子可晒干或是阴干，蜕皮后需催芽生长后，选在在秋季的时候播种，需在在排水性的沙性土质培育，将种子均匀的铺撒在泥土表面，上面盖上20厘米后的土层，榉树小苗购买，等到30天后，发芽的小苗就算是存活的无患子小苗。

扦插繁殖需在每年的秋季落叶的时候，挑选当年生或者多年生的老枝作为树种，每根细枝剪成12厘米长的小段，注意靠近芽口的位置要用斜剪。扦插的土质还是要选在排水性好的沙性土质，采用密插的方法扦插，有芽口和叶子的位置要向上。扦插好要保存土质水分充足，又不积水，在每个1.5的位置挖一条排水沟。等到20天后，枝条的新嫩叶长出来后，可少量施肥。等高度达到30厘米后，可将密插的小苗移植开，培育大苗无患子。

红枫它的繁殖方法可分为三种：扦插、播种、嫁接，主要是这种中等乔木的生长速度比较慢，加上其观叶的价值比较大，可直接嫁接到中等规格乔木树上面，存活后满树冠都是红枫红叶很美丽，句容榉树小苗，接穗是从一棵结实、无虫害的红枫母树中挑选出来的，榉树小苗木，采集接穗是为了避免日晒。采集接穗时剪去复叶，只剩下2厘米长的叶柄，接穗存放在盛有3-5厘米清水的塑料桶中，可以作为接穗采集。

主要分为春秋两季 春天主要是枝接，一般嫁接在树液开始流动和芽萌发之前比较好。秋季，幼苗

新芽基本停止生长，芽饱满，营养充足，丹徒区榉树小苗，形成层仍处于活跃状态，易于嫁接和愈合，但为时不晚，以免界面愈合不良，难以越冬。

具体的嫁接时间因地区而异。甘肃陇东地区嫁接时间为4月中旬至下旬。

分支嫁接采用扦插嫁接的方法，选择蜡封生长枝作为接穗，每节接穗保留2-3个完整芽 嫁接时，用小刀在接穗下部切割出3.5厘米长的切割面，切割面平直，然后在切割面的另一侧切割出2.5厘米长的小切割面，使下端稍尖，接穗上部留2-3个芽，大切割面后面留顶芽，切割面必须光滑，芽上方留0.5厘米进行切割 在易剥期，用嫁接刀在砧木的锯口处将砧木的皮层和木质部剥离，然后快速插入接穗切割面，形成层对齐，接穗切割面用塑料膜包裹。

丹徒区榉树小苗-洪建苗木-句容榉树小苗由句容市茅山镇洪建苗木种植园提供。句容市茅山镇洪建苗木种植园（jrjmm.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！