

山东桃树苗 桃树苗批发 山东鑫农园艺

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山东桃树苗 桃树苗批发 山东鑫农园艺 |
| 公司名称 | 山东鑫农园艺科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市省庄柳杭村 |
| 联系电话 | 13105387126 13105387126 |

产品详情

适合桃苗密植的有哪些优良品种?

矮化桃苗密植是桃苗栽培的重要改革，亩栽44-55株时为低密度栽植，亩栽83株时为中密度，亩栽111株以上为高密度。当前桃苗密植栽培主要采用三种方式，即利用矮化砧、利用紧凑株型品种和人工控制矮化。在矮砧桃苗密植中应用最多的是M系矮化砧木.如M2。和M.，.用M2作根砧或中间砧都可使乔化品种矮化大约1/2，生产上常用的优良品种红富士、新乔纳金、新嘎拉等，都可嫁接上进行矮化栽培。

利用短枝型品种桃苗密植比较容易，在普通砧木上直接嫁接短枝型品种即可，树冠相当于普通品种的2/3大，是目前应用最多的方式。元帅系短枝型品种有首红、岱红、新红星、烟红、红矮生（红短枝）、超红等。富士系短枝型品种有福岛短枝、宫崎短枝、优良短枝等。青香蕉的短枝芽变烟青是较优良的晚熟品种。

利用人工矮化的方法桃苗密植应用较少，因为费工太多。但有些早熟品种树冠较小，腋花芽结果多。可以不用矮化砧，跟上人工控冠、实行桃苗密植。这类品种可以选用辽伏、早捷、华帅。

桃苗的栽培特点

桃原产我国海拔较高，山东桃树苗，日照长、光照强的西北地区，适应于空气干燥、冬季寒冷的大陆性气候，因此桃树喜光、耐旱、耐寒力强。温度是影响桃树分布的主要因素，在陕甘宁地区和新疆南部、东北吉林，冬季温度在-23到-25 以下时容易发生冻害，早春晚霜危害也时有发生，防冻防霜至关重要。

在南方冬季三个月平均气温超过10度的地区，多数品种落叶延迟，桃树苗价格，进入休眠不完全，翌春萌芽迟，开花不齐，产量降低。栽培时要注意桃树的需寒量，不同品种对低温的需求量差异大，一般用7.2度以下的积温来表示，大部分品种的需寒量为500到1000小时。桃树怕渍涝，淹水24小时就会造成

植株枯萎，选择排水良好、土层深厚的沙质微酸性土壤较为理想。

桃树多为复花芽，成花易，花量大，白花结实率高。在生产上考虑到异花授粉可明显提高结实率，特别是有些花粉的品种如砂子早生、霞晖一号、仓方早生等应配置授粉树以求高产、稳产。

桃苗流胶病应该如何进行防治？

1、发病特点：桃树流胶分为浸染性流胶和非浸染性流胶两种。

浸染性流胶病：又称疣皮病、瘤皮病，主要危害枝干，也可危害果实。枝干流胶又分为皮孔流胶和伤口流胶。皮孔流胶，先在染病枝干产生以皮孔为中心的疣状隆起疤痕，后渐扩大至疤痕破裂，溢出无色半透明稀薄有黏性的软胶，不久变为茶褐色，质地变硬呈结晶状。伤口流胶则主要是果实、枝干出现虫口、裂口、机械伤口等，在伤口边缘处出现流胶，造成果面硬化、龟裂、树势衰弱，严重时枯死。

非浸染性流胶：又称生理性流胶，主要危害主干和主枝桠杈处，小枝条、果实也可被害。主干、主枝受害初期，病部稍肿胀，早春树液开始流动时，从病部流出半透明黄色树胶，雨后尤为严重，桃树苗批发，病部易被腐生菌浸染，使皮层和木质部变色腐烂，致使树势衰弱，叶片黄、小、严重时枝干或全株枯死。果实发病，由果核内分泌黄色胶质，溢出果面，病部硬化、龟裂，发育受阻，不能食用。

2、防治措施

(1)桃树萌芽前，使用21% H_2O_2 水剂5—10倍液或80%乙蒜素乳油1000倍液涂抹病斑。

(2)开花前后，可选用50%氯异尿酸可湿粉剂750倍液或21% H_2O_2 水剂500倍液、70%硫菌灵可湿性粉剂1000倍液、50%异菌脲悬浮剂1000倍液进行防治。

山东鑫农园艺科技有限公司自成立以来，承蒙全国各地园艺界朋友的大力支持，产品远销到河南、北京、天津、河北、内蒙、新疆、山西、甘肃、上海、江苏、浙江等东南西北全国各地，哪有桃树苗，普遍受到用户的好评。我们的苗木抗病害强、成活率高，适应性强，适合全国各地种植。真诚希望全国各地园艺界朋友来实地考察洽谈。我们本着：质量为先、信誉为本、真诚合作、互惠互利的宗旨，热诚欢迎广大经营户前来实地参观、选购指导。

山东桃树苗-桃树苗批发-山东鑫农园艺(推荐商家)由山东鑫农园艺科技有限公司提供。“吉塞拉砧木,核桃苗,果树苗,樱桃苗”就选山东鑫农园艺科技有限公司(www.jsailayingtao.cn)，公司位于：山东省泰安市省庄柳杭村，多年来，山东鑫农园艺坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东鑫农园艺期待成为您的长期合作伙伴！