

# 聚酯瓶批发 欣鸣塑业 镇江聚酯瓶

产品名称	聚酯瓶批发 欣鸣塑业 镇江聚酯瓶
公司名称	泰安欣鸣塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁阳县东庄镇
联系电话	17662516599 17662516599

## 产品详情

### 聚酯瓶

#### 农药使用时的注意事项

- (1) 配药时，配药人员要戴胶皮手套，必须用量具按照规定的剂量称取药液或药粉，不得任意增加用量。严禁用手拌药。
- (2) 拌种要用工具搅拌，用多少，80ml聚酯瓶，拌多少，聚酯瓶批发，拌过药的种子应尽量用机具播种。如手撒或点种时必须戴防护手套，以防皮肤吸收中毒。剩余的毒种应销毁，不准用作食粮或饲料。
- (3) 配药和拌种应选择远离饮用水源，居民点的安全地方，要有专人看管，严防农药、毒种丢失或被人、畜、家禽误食。
- (4) 使用手动喷雾器喷药时应隔行喷。手动和机动药械均不能左右两边同时喷。大风和中午高温时应停止喷药。药桶内药液不能装得过满，以免晃出桶外，污染施药人员的身体。
- (5) 喷药前应仔细检查药械的开关、喷头等处螺丝是否拧紧，药桶有无渗漏，以免漏药污染。喷药过程中如发生堵塞时，应先用清水冲洗后再排除故障。禁止用嘴吹吸喷头和滤网。
- (6) 施用过高毒农药的地方要竖立标志，在一定时间内禁止放牧、割草，以防人畜中毒。

企业视频展播，请点击播放

## 聚酯瓶

### 农药要在干燥、阴凉条件下储藏

大多数化学农药都具有吸湿性，镇江聚酯瓶，尤其是粉剂 and 可湿性粉剂，会因空气湿度过大而吸湿结块、变质失效。有机磷农药易与水发生反应而分解失效，如乐果、敌敌畏遇湿气易水解，代森锌等暴露在空气中会吸收空气中的水分，分解放出二氧化碳而失效。因此，储藏农药的地方要注意通风，保持干燥，一般相对湿度维持在75%以下。还有些农药被日光照射后易出现絮结、沉淀、混沌等现象而失效，特别是细菌农药，如杀螟杆菌、青虫菌，在日光中紫外线的照射下，其中的微生物细菌会很快失活。

塑料制品增亮就是提高塑料制品的表面光泽度或光洁度，具体方法除原料的合理选取外，还有添加增亮方法、共混增亮方法、形态控制增亮方法、成型设备光洁度的控制、二次加工增亮方法及表面涂层增亮方法等。

塑料原料的选取是提高塑料制品表面光洁度基本的因素原料选取得好，那么光泽度提高则容易；相反，就比较困难。

很多塑料瓶生产厂家认为蜜胺树脂、ABS、PP等树脂对应制品的光泽性比较好：乳液法PVC树脂比悬浮法PVC树脂的光泽度高；不同聚合方法合成品种的光泽度大小，具相应制品的光泽度越大，聚酯瓶生产厂家，分子量分布越宽，其相应制品的光泽度下降。这主要是因为分子量分布宽，材料的不规整性增大了。

聚酯瓶批发-欣鸣塑业(在线咨询)-镇江聚酯瓶由泰安欣鸣塑业有限公司提供。泰安欣鸣塑业有限公司（www.taxmsy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣鸣塑业——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市宁阳县东庄镇南故城村，联系人：齐总。