

绿化苗木 张桂杨花木 海南苗木

产品名称	绿化苗木 张桂杨花木 海南苗木
公司名称	庐江县张桂杨花木有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	庐江县盛桥镇盛白路迎宾大酒店南侧
联系电话	13685697648

产品详情

绿化树苗-扦插桂花几年开花

一般扦插的桂花4-6年的树龄就可以开花了，当然影响桂花开花的原因有很多，如果到了开花的条件而没有开花就可以采取催花处理。

扦插的桂花苗一般在4-6年的树龄会开花，有些会受到特殊的气候影响早开花，或者晚开花甚至不开花，可以采取以下措施：保证低温冬眠：3度以上不必入室，越冬温度3到5度，10度以上，会使桂花过早抽芽展叶，绿化苗木，大量消耗养分，再加上光照不足，海南苗木，烟1尘污染，绿化苗木价格，植株虚弱，春季入室，风吹日晒，叶稍干枯，即使再发新芽也不易开花。保证长日照：桂花需要10小时以上的阳光，否则树叶不茂盛，影响花芽孕育生长和开花。

果树苗移栽的方法

整地与移栽:移栽前要精细整地，施足基肥，每亩5000公斤左右，如地过于时可先浇足水，然后用铁铲挖出幼苗，按行距35-40厘米，株距7—10厘米的距离栽于畦内，栽后浇水，水的大小以不淹没幼苗为宜.果树苗移栽较好在早晨或下午，趁阴雨天移栽更好.一般成活率在95%以上.

果树苗的栽后管理:有条件的在果树苗栽后可遮阴1-2天，以提高成活率.五月到六月，结合浇水追肥1次.果树苗长到35厘米左右时，可摘心促进加粗生长.到秋季移栽苗一般可以长到40-50厘米，管理好的可以达到60-70厘米，这时就可进行嫁接，第二年就出成品苗。

避免在低洼粘重的土壤上育果树苗小苗苗，减少果树苗小苗根部白娟病发生的危害，地势低洼粘重排水

不良，遇雨积水，造成土壤缺氧，有利于果树苗小苗苗根部白绢病的发生、蔓延，苗木价格，危害苗子根部，致使苗根及茎基部皮层变色腐烂，表面有白色绢状菌丝和棕色小菌核，造成整株死亡。防治方法：1、选择地势平坦，排水良好的沙质土育苗。2、下大雨后及时排水，避免长时间积水，防止根系缺氧。3、土壤板结时及时松土，增加土壤通透性，保证氧气供应。4、耕地移苗前每666.7平方米施25公斤硫酸1亚铁进行土壤消毒，减少病原菌发病基数。5、及时预测病情发生情况，如发现少量叶子发黄，树势减弱，可挖根检查，发现病菌浸染，可用500-800倍安锁菌毒清药液灌溉根消毒，或将个别病株从地里彻底清除销毁，以防1菌丝进一步传1染。

绿化苗木-张桂杨花木-海南苗木由庐江县张桂杨花木有限公司提供。庐江县张桂杨花木有限公司（www.zhangguiyang.com）是一家从事“果树,花卉,苗木”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“张桂杨花木”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使张桂杨花木在花木中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！