

宁波红肉脐橙苗 松滋市欣峰苗木种植

产品名称	宁波红肉脐橙苗 松滋市欣峰苗木种植
公司名称	松滋市欣峰苗木种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省松滋市陈店镇
联系电话	15907214443

产品详情

合理灌溉也是纽贺尔脐橙丰产的重要措施。一般柑园土壤的相对持水量应保持在65%~75%之间，即要保持土壤比较湿润。春夏季雨水较多的季节，要做好梯田排水沟的清理工作，以保证柑园不积水；秋季一般雨水较少，特别是10~11月是果实迅速膨大期，更要加强灌溉，以利果实膨大。另外，要注意防止久旱遇雨，造成裂果。

目前本基地主要苗木品种如下纽荷尔脐橙苗，大分四号柑桔苗，早熟砂糖桔苗，赣南早脐橙苗，爱媛38号柑桔苗，沃柑苗，卡拉红肉脐橙苗，明日见柑橘苗，国庆蜜桔苗，红桔苗，夏橙树苗，红桔苗。

腹接法：

腹接是柑橘繁殖中应用非常普遍的一种嫁接方法。具体接法是将接穗安插于砧木一侧，要求砧木比接穗粗大。腹接的接穗可以是单芽，也可以是芽苞片。用单芽作接穗称单芽腹接。用芽苞片作接穗称芽苞片腹接。砧木切口距地面10-15cm，选择东南向、光滑一侧作切口。切口的形状有多种，常用的是“门”形和“T”形2种。“门”形切口操作方法是刀前1/3紧贴于砧木主干，向下推压纵切，由浅至深切开砧木皮层，切口长度比接穗略长，红肉脐橙苗，并切掉削开皮层的1/3-1/2，以免砧木切开的皮层包住接穗芽眼，然后将接穗放入切口内，接穗的皮层应对准砧木切口的皮层，接穗的短削面下端与砧木切口底部接触，用薄膜条带将接穗和砧木切口包扎紧。春季及5-6月份腹接时，可作露芽包扎；秋季嫁接时，应将接穗全包在薄膜内。在嫁接操作过程中，应保持接穗削面、砧木切口和存放接穗用的水清洁，以提高嫁接成活率。

目前本基地主要苗木品种如下纽荷尔脐橙苗，大分四号柑桔苗，早熟砂糖桔苗，赣南早脐橙苗，爱媛38号柑桔苗，沃柑苗，卡拉红肉脐橙苗，明日见柑橘苗，国庆蜜桔苗，红桔苗，夏橙树苗，红桔苗。

树势中庸，营养生长和生殖生长较为平衡。花量较大，与一般脐橙相似，但表现座果率高，多年平均可达4.56%，远优于普通华盛顿脐橙的0.63%。树冠容积单位座果量37.37个/m³，高于华脐的11.02%。

母树(红桔砧)多年丰产稳产，年均50kg以上。高接树(6年生)

投产快，一年后可恢复树冠，第三、四年产量平均可达8-10kg/株(甜橙中间砧/枳基砧)。

宁波红肉脐橙苗-松滋市欣峰苗木种植由松滋市欣峰苗木种植基地提供。松滋市欣峰苗木种植基地(xfm mzz.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣峰苗木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。