

藤稔葡萄苗 根明葡萄专业合作社

产品名称	藤稔葡萄苗 根明葡萄专业合作社
公司名称	金华市根明葡萄专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区赤松镇项村村项旺街19号
联系电话	13806782644 13806782644

产品详情

金华市根明葡萄专业合作社致力于葡萄新品种以及种植技术的研究、推广，现主要销售夏黑、、美人指、维多利亚、金手指、巨峰、甬优1号、黑色甜彩等这些品种，口感很好，产品质量可靠，值得您的信赖！

刺蛾防治方法

八月份防治措施

1、人工摘除虫叶：刺蛾的小幼虫具有群集危害的特性，常使被害叶呈枯膜状，山东黑芭拉蒂葡萄苗厂家，目标明显，易于发现，可组织人力及时摘除消灭，防止扩散蔓延危害。

2、灯诱成虫：根据大多数刺蛾类成虫具有趋光性的特点，8月初在成虫羽化期，设置黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫，效果明显。

3、生物防治幼虫

(1) 8月下旬幼虫发生期施药喷洒青虫菌，每克含100亿孢子1000倍液，可使幼虫感病率在80%以上。如能混入0.3%茶枯或0.2%中性洗衣粉可提高防效。

(2) 用每克含孢子100亿的白僵菌粉0.5至1千克，在雨湿条件下防治I至2龄幼虫。

4、药剂防治：刺蛾幼虫对药剂抵抗力弱，8月下旬幼虫发生时可喷50%辛硫磷乳油、25%亚胺硫磷乳油1500至2000倍液或2.5%乳油2500-3000倍液进行喷杀。

苗圃种植规划：过于密集的苗圃不利于机械进行转弯。种植规划在3-3米以上的间距，挖树及转运作业对其他植物的影响才会比较小。欧美苗圃往往在苗木小的时候种植在盆里，调整种植间距很容易。苗圃种植地上会铺上50厘米厚的石子，底层是粗石子，上层是细石子，这些石子可以阻挡杂草生长，降低地表温度，同时能促进及时排水，不必采用挖沟的方式排水。石子上面在铺上塑料编织布，编织布上按照植物的冠幅来排布苗木种植盆。这些种植设施系统与机械化操作的衔接很顺畅，所以机械化与苗圃的种植模式调整是一个彼此适应的结果。

苗圃经营工作内容包括：苗木种植、苗木进出、苗木部分的浇水排水、施肥除草、整型修剪、病虫害防治以及园区内保洁等一系列内容。中耕除草 1. 杂草不仅消耗大量水分和养分，且会传播各种病虫害，故除草“宜早、宜小、宜了”改善苗木生长环境。根据杂草生长况，全年计划除草2-4次。2. 除草方法：机械旋耕、机器打草、空地或大乔木下使用化学剂除草、灌木或小乔木下人工除草。3. 为了促进苗木快速生长，保持土壤疏松、蓄水蓄肥能力，每年要进行2-4遍的中耕。4. 结合中耕，也可以去除杂草。