

广东苗木 张桂杨花木 成活率高 绿化苗木

产品名称	广东苗木 张桂杨花木 成活率高 绿化苗木
公司名称	庐江县张桂杨花木有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	庐江县盛桥镇盛白路迎宾大酒店南侧
联系电话	13685697648

产品详情

如何才能防止冬季果树苗木的虫害

果树苗木出现虫害是果农最不愿意看到的，出现虫害的果树苗木直接会影响果树苗的生长，这就需要我们提前做好预防工作，如何才能防止冬季果树苗木的虫害。

一、天牛害：有桑天牛、星天牛、栎红颈天牛三种，2—3年发生一代，危害木质部和髓心，被害部位表皮正常，每隔一定距离有一排粪孔，虫道产直，红褐色虫粪排出堆积于地面，用棉花球、蘸少许80%敌1敌畏乳油或0.2克磷1化铝制成毒签塞入倒数一或二排粪孔内，并用湿泥将全部粪孔封死，磷1化铝毒性很强，使用时注意安全，。

二、吉丁虫类，寄生于苹果、梨树，苗木报价，1—2年发生一氏，危害浅皮层，韧皮层和形成层，被害部位皮层开裂，虫疤外有红色粘液渗出，俗称“冒红油”，虫道螺旋上升呈椭圆形，早已道内堆满褐色虫粪，用1公斤煤油加0.1公斤80%敌1敌畏乳油，搅匀涂抹于虫疤处，杀列其幼虫。

果树苗新品种的嫁接步骤及方法有哪些呢？

先将砧苗距地面4~5厘米的光滑迎风面擦净泥土，用芽接刀横切一刀，深达木质部，刀口宽度为砧木周的一半左右，然后在刀口中间向下竖划一刀，竖刀口稍短一点，再削接芽。

接穗应挑选品种优良、生长健壮、无病虫害的后果母树上的一年生枝条，先在接穗芽的上方0.6厘米左右横切一刀，刀口宽是接穗直径一半左右，然后刀由芽下1厘米处向上斜削，由浅入深达横刀口上部，绿化苗木，然后用左手拇指和食指在芽茎部悄悄一捏，芽片即可取下。立即挑开砧木拉口皮，把接芽疾速插入，使芽片横刀口与砧木的横刀口对齐，然后用有弹性的1厘米宽的塑料薄膜包扎好。嫁接后及时喷施就苗海藻酸碘增强抗病力。这种嫁接办法普通成活率可达95%以上，嫁接后7~10天反省能否成活。

金桂又被很多人称为八月桂，从八月桂这个名字就可以看出金桂是在农历八月开花的，准确一点就是中秋节前后。

金桂什么时候开花？

金桂主要是开黄色花系，金桂的花是桂花所有品种里面最香的一个品种，金桂什么时候开花还与它本身的繁殖方式有关。

如果是从已经开花的金桂树上取下枝条嫁接，一般一年内就是开花，苗木公司，嫁接金桂繁殖是金桂开花最快的繁殖方式。

金桂扦插繁殖，扦插的金桂一般开花时间是需要大概4-6年的树龄，广东苗木，也有少部分移栽之后没多久会开花，这些属于反季节的花，之后再开花就需要4-6年的树龄了。还有一种播种繁殖的金桂，这种桂花苗的开花时间就有点晚了，大概要十年树龄之后才开花。

广东苗木-张桂杨花木-成活率高-绿化苗木由庐江县张桂杨花木有限公司提供。庐江县张桂杨花木有限公司（www.zhangguiyang.com）在花木这一领域倾注了无限的热忱和热情，张桂杨花木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。