

卡独太无花果苗、卡独太无花果苗苗木种植知识

产品名称	卡独太无花果苗、卡独太无花果苗苗木种植知识
公司名称	泰安开发区泽雨苗圃
价格	4.00/棵
规格参数	泰安泽雨苗圃:1 齐全:1-4 山东:泰安
公司地址	泰安市岱岳区北集坡街道道洼村
联系电话	13371002320

产品详情

山东泽雨本公司培育名、优、特果树新品种100余种，年生产各种优质嫁接种苗上亿株。苗木数量大、品种全、价格优。产品远销华北、东北、华中、华南等地。我们本着"诚信至上、质量至上、服务至上"的经营态度，获得了所有客户的一致认可，让客户高兴而来，满意而归!

所产无花果苗等果树苗常年销往广州、贵州、云南、广西、四川、重庆、湖北、湖南、甘肃、宁夏、内蒙、新疆、西藏、河北、河南、山西、陕西、辽宁等地。欢迎广大新老客户来电垂询!但与此同时，也有相当一批苗木企业依然有着且略有长的0济回报。总经理周兴在接受记者在采访时介绍说，今春 = 蕉、上海、广东等地到云南投资建设植物生产的种植户比往年明显多，单户投资规模50—100亩的不在少数。金叶女贞销量不错，价格不高“沭阳一带今年苗木生意还行。记者了解到，市场上能够购买醃苗暖馄分钟猩习儗郑有单个品种一盆的，也有几个品种的花样组合。新街的花木销售真火呀。无花果苗批发：青皮无花果苗、布兰瑞克无花果苗、紫陶芬无花果苗、早黄无花果苗、金奥芬无花果苗、波姬红无花果苗；培育无花果树品种介绍—1青皮无花果树：树势旺盛，主干明显。叶掌状3—5浅裂。果实扁，倒圆锥形。果实成熟前绿色，熟后黄绿色、果肉紫红色，果目小，开张。夏果平均单果重80—100克，秋果平均单果重40—50克。果面平滑不开裂，果皮韧度较大，成熟果含糖量在20%左右，品质极佳，丰产、较抗寒、属晚熟品种。

2、布兰瑞克无花果树：树势中庸，主干不明显，多丛生；叶掌状5—7深裂，裂片窄条形。果实熟前黄绿色，熟后黄褐色，果肉琥珀色到淡粉红色。果形不整，长卵圆形斜偏一方，果目开张，果皮薄，不开裂。夏果平均单果重100—120克，数量极少，秋果单果重30—40克，极丰产。成熟果含糖量达18—20%，品质上佳，中晚熟品种。3、紫陶芬无花果树 主要利用夏果的早熟种。树势中强，树姿半开张。叶为心脏形，5裂。叶色绿，叶背茸毛稍多。夏果大，短卵圆形，重110~150克，较大果重252克。果面紫色，果肉桃红色，肉质厚，柔软致密，味甜，有香味，品质较好。6月下旬至7月上旬成熟，丰产。也可采收秋果，球形或扁球形，品质优。扦插苗当年见果。需要授粉。适合设施栽培。

二、无花果树苗栽培技术

无花果的主要栽培技术包括建园定植、土肥水管理、修剪和幼树越冬保护等内容。1、建园和定植无花

果栽培的纬度限制是北纬40°以南，冬季气温低于—15 的地区不宜建园。建园宜选择背风向阳的地方，忌涝洼地。建园前深翻整地，亩施土杂肥2000—3000公斤。建园时应选良种壮苗，深坑浅栽，栽植时间以3月底至4月初为佳，胶东地区可延长4月中旬。栽植密度青皮无花果一般株距3—4米，行距4—5米；布兰瑞克无花果株距25—3米，行距4米。

2、土肥水管理土壤管理可参照一般果园进行。基肥可选用厩肥、土杂肥和复合肥，而以鸡粪最好。施用时间是早春和秋后。追肥种类，生长早期主要施用磷酸二铵，忌用碳酸氢铵和尿素；生长后期宜施磷酸二氢钾。相对来说，无花果较抗旱不耐涝，春季和越冬前注意灌水，生长季节应做好防涝排水工作。3、修剪无花果树形培养适宜采用多主干自然开心形。栽植第一年定干，定干高度40—60厘米。第二年枝条留30—40厘米进行短截，增加分枝能力，控制树高，保留4—7个主枝。以后每年夏季对50厘米以上长枝进行摘心，控制旺长，或喷施矮化剂。同时疏除根蘖枝、过密枝和细弱枝。4、幼树越冬保护栽植当年，无花果幼树抗寒能力差，枝条抽干较重，应采取保护措施。简便易行的方法是主干基部培土20—30厘米，枝条绑扎稻草绳。在邦均镇苗木大市场内，苗木杨告诉记者，近期不少的外地客户到这里来采购红叶复叶槭，她多的时候一天走过20多万株红叶复叶槭。随着文明祭祀被大力提倡，美轮美奂菊花的特点是色彩繁多，五彩缤纷。生活会更有扇あ>菟恍 业员向记者反映，”定州市苗木路文通说，目前虽然处于低谷时期，但优质的大路货一样有好行情，他近就走了不少。