

## 李子苗新品种推荐 山东李子苗基地

产品名称	李子苗新品种推荐 山东李子苗基地
公司名称	泰安丰兴农业科技有限公司
价格	.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄
联系电话	0538-8911293 18554190888

## 产品详情

李子树管理要点：

1 修剪方法。李子以短果枝及花束状短果枝结果为主，因此修剪上以轻剪长放、通风透光为原则。对第一年结果树应以整形为主，适当加大修剪量。而多年生树基本采用疏剪、回缩、拉枝等措施，以缓和树势，控制营养生长。

抹芽。芽萌发后立即掰除，有萌芽发育成嫩枝需剪除或掰掉。

摘心。摘心可在新梢长到10-15厘米时进行。摘心的次数根据树的长势和要求而定。

扭梢。扭梢以新梢长到30厘米、还未木质化时进行，将背上枝、竞争枝及内向枝，在距基部5-10厘米处轻轻扭转180度角。

拿枝。7月份对一年生直立枝、竞争枝从枝条基部用手折弯。然后顺枝向上5厘米折弯一下，直到先端

环剥。接近停止生长时，对旺树主干或大枝做环状剥皮，剥皮宽度为被剥梢条直径的10%左右，促花效果明显。

疏花。生长势弱、花量大的果树要多疏少留；生长势强的要少疏多留。

疏果。1个花束状果枝留1~2个果，短果枝留1个果，中果枝留2~3个果，长果枝留4-5个果。

2 肥水管理。 幼树施肥掌握“薄肥勤施”原则，以氮肥为主，适当配以磷钾肥。4-11月，每月每株追施尿素0.05千克、过磷酸钙0.1千克、磷酸二氢钾0.05千克，全年追施8次。

成年树春季开花前，亩施尿素和复合肥各25千克。幼果期追施速效氮肥，促进硬核花芽分化。冬灌前施足基肥，一般在行间挖深、宽各40厘米的施肥沟，亩施腐熟有机肥3000千克加多元素复合肥150千克，浇透水。干旱季节及时灌水，夏季覆盖降温保湿。

3 病虫害防治。李子的主要病虫害有红点病、流胶病、穿孔病、桑白蚧、食心虫等。可采用秋季深翻树盘、冬季清园、萌芽前喷2次3~5波美度的石硫合剂，生长季节针对病情再喷施0.3-0.5波美度的石硫合剂等方法防治。对于红点病、穿孔病严重的果园于5月中旬至6月中旬连续2次喷布65%代森锌粉剂500~600倍液防治。李实蜂在成虫产卵前喷布20%速灭杀丁乳油3000倍液或2.5%敌杀死4000倍液毒杀成虫，在萌芽前和脱果人土期树冠下喷洒25%辛硫磷乳油500倍液防治。