

## 李子苗、李子苗批发基地

产品名称	李子苗、李子苗批发基地
公司名称	泰安市春信农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	品种:李子苗基地 规格:1公分 地区:山东春信农业
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡办事处北集坡村（注册地址）
联系电话	15684770012

## 产品详情

秋红李子苗：秋红李，又名龙园秋李，是新培育而成的晚熟大果型李品种。果实扁圆形，横径6.19cm，纵径4.88cm，果形指数0.79；果梗粗短；4月初花芽萌动，4月下旬开花，8月中旬成熟。平均单果重89g，大果重达112g。果实底色黄色，果面鲜红或紫红，果粉厚。果肉黄色，硬肉；含可溶性固形物14%左右，口味酸甜适口，充分成熟时有香味。秋红李适应性强，耐瘠薄，生长旺盛且极性生长强，成枝力强，丰产。

李子树夏季管理之肥水管理：幼树施肥掌握“薄肥勤施”原则，以氮肥为主，适当配以磷钾肥。4-11月，每月每株追施尿素0.05千克、过磷酸钙0.1千克、磷酸二氢钾0.05千克，全年追施8次。成年树春季开花前，亩施尿素和复合肥各25千克。幼果期追施速效氮肥，促进硬核花芽分化。冬灌前施足基肥，一般在行间挖深、宽各40厘米的施肥沟，亩施腐熟有机肥3000千克加多元素复合肥150千克，浇透水。干旱季节及时灌水，夏季覆盖降温保湿。

李黑斑病：症状是李子树重要病害，危害叶片、小枝和果实。叶片染病产生紫褐色圆形病斑，病斑周围有淡黄色晕圈，后期造成穿孔。新梢染病，产生暗绿色水渍状病斑，病斑绕梢1周时枝枯死。果实染病，初生水渍状褐色小斑，逐渐扩展成紫褐色近圆形病斑，略凹陷，湿度大时可产生黄色黏液，内有大量细菌，近成熟时产生裂纹。防治方法：(1)李树发芽前喷5波美度石硫合剂。(2)发病季节喷500克/升，异菌脉悬浮剂或50%可湿性粉剂1000倍液或50%氯溴异氰尿酸可溶性粉剂1000倍液、5%菌毒清水剂500倍液。

李子苗、李子苗批发基地他们认为别人种了能赚钱自己种了肯定不会亏，“现在种‘一品红’挣钱就像，再使劲都难，但花钱就像拉肚子，想憋也憋不住。2006年，经过6年的精心培育，聂育才的桂花苗有了一定规模，多的时候育有小口径金桂、丹桂等多个品种200万株。这些玫瑰花都是从南方城市运来的，“我搜集品种的目的，不是想赚点小钱。李子苗栽培密度定植密度既要考虑充分利用棚区面积，又要注意通风透光。经试验，温室栽培采用2×1米的栽植规格为宜。

李子苗栽植技术：1.园地的选择脆红李对土壤没有特别严格的要求，但是由于其根系分布于土壤表层，不耐涝，因此应该选择不易积水，土层深厚的沙质土壤。选地势高燥、向阳、背风、南坡，土层深厚，土壤肥沃，疏松透气，地下水位低，以前未种植李树或种植后间隔5年以上，交通方便的沙壤土。2.栽植密度和整地时期山区土壤较薄，坡度较大，果农一般沿土埂栽植1~2行，株距3m×4m为宜。栽植方式：平地可以采用长方形、正方形、三角形（猪蹄叉），山地主要采用等高栽培。整地时间一般在每年的11月。

法兰西梅李子苗：果实为卵圆形，单果重75克左右，最大110克，果皮成熟时为深紫红色，果肉淡黄色，肉硬核小味酸甜，品质极佳，该品种适应性广，抗逆性强，树体中庸，叶片卵圆形，多以短枝结果为主。果柄部有乳头状突起，果实可溶性固形物达20%以上。果实耐储运，常温下可储藏20-30天，冷库可贮藏3个月以上。北京地区8月中下旬果实成熟。它是近年来在市场上价格和反响都非常好的高档水果。

李子的栽培管理技术：一、栽培技术（一）选苗选择品种纯正、根系完整、健壮、芽质饱满、无检疫对象和无病虫害的李子苗。（二）定植一般株行距为2.5米×4米，芽未萌发前（最好在4月20日前）栽植。李子有自花不孕现象，因而，栽培品种不宜单一，应隔一定距离栽植花期一致的不同品种做授粉树，比例为4：1或8：1。二、肥水管理（一）施肥1、基肥基肥是能较长时间供给李树多种养分的基本肥料，一般以迟效农家肥为主，如堆肥、厩肥、作物秸秆、绿肥、落叶等。基肥秋施为好，成年李树，基肥每株施农家肥50—100公斤。2、追肥（1）花前追肥：可在李树萌芽前10天（4月上旬），株施0.5—1公斤速效性氮肥或25公斤腐熟人粪尿。（2）花后追肥：应及时追施速效性氮钾肥，以减少生理落果，在5月下旬至6月中旬，株施0.5公斤。（3）果实膨大和花芽分化期追肥：在生理落果后至果实进入迅速膨大期前（6月下旬至8月中旬），追施速效氮、磷、钾复合肥，株施0.5—1公斤。（4）果实生长后期追肥：在果实开始着色至采收期间追肥。此次以磷、钾肥为主，速效氮肥以叶面喷施为好，浓度为0.2—0.3%，结合喷药进行。（二）灌水李树在一年中各个物候期都需要一定水分，萌芽前和幼果膨大期，新梢生长期应进行灌溉，入冬前需灌一次封冻水，另外，李树怕涝，故李园应修排水系统，以免遭受涝害。

李子苗、李子苗批发基地收购新街花木，就是帮助新街的苗农。冠幅3米的桂花树市场交易价格是1000元/株，预订玫瑰花价格是12元/支，百合花是18元/支。”保定东二环花卉市场的花商于说，近商户都已经在备战年宵了，大家平时经常聚在一起商议采购什么花卉，但少有人提及君子兰，估计君子兰的上市量不会太大，处于配角的地位已经不置可否了。4月3日消息：春天是播种的好时节。李树缺钾症：症状先从枝条中下部叶开始出现症状，常在叶尖两侧叶缘焦枯，并向上部叶片扩展。由于缺钾，氮的利用也受到限制，叶片呈黄绿色，表现出一定程度的缺氮症状，但黄化叶不易脱落。一般叶片含钾低于1%，即缺钾。防治方法(1)在轻度缺钾的土壤上，不要偏施氮肥，避免缺钾症出现。(2)果园缺钾时，6—7月追施草木灰、氯化钾或硫酸钾。(3)叶面喷施2%磷酸二氢钾液。李树缺钾症：症状先从枝条中下部叶开始出现症状，常在叶尖两侧叶缘焦枯，并向上部叶片扩展。由于缺钾，氮的利用也受到限制，叶片呈黄绿色，表现出一定程度的缺氮症状，但黄化叶不易脱落。一般叶片含钾低于1%，即缺钾。防治方法(1)在轻度缺钾的土壤上，不要偏施氮肥，避免缺钾症出现。(2)果园缺钾时，6—7月追施草木灰、氯化钾或硫酸钾。(3)叶面喷施2%磷酸二氢钾液。