

2公分杏树苗批发，杏树苗多少钱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 2公分杏树苗批发，杏树苗多少钱 |
| 公司名称 | 泰安市广祥农业科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 粗度:2公分 高度:150公分 产地:泰安 |
| 公司地址 | 山东泰安高新区北集坡镇 |
| 联系电话 | 0538-8912686 13954886187 |

产品详情

杏树嫁接方法：

- 1.接穗：接穗要采用随时采，随时接的方法，对采摘之后的接穗，去叶留梢。选用一年生活着二年生的发育枝，如果有条件的话，嫁接后为嫁接树苗适当遮阳，因为温度过高会导致枝条的活力下降，影响接穗的嫁接成活率。
- 2.嫁接时期：嫁接要选择晴天，以免阴雨天气会对嫁接口形成感染，这种天气容易导致接口出现流胶，从而愈合不佳，影响嫁接后的成活。
- 3.嫁接方法：芽接首先要取芽片，在接芽上10毫米的地方横着入刀，然后向下再切一刀，形成“T”形芽接，然后在芽基部削一个长为半厘米的口子，确保鱼上一刀重合，就可以取下芽片了。枝接则选取插穗中间的一些新鲜的芽，从新鲜的芽的上方横着切一刀切到大约植物木质部的地方，然后再从芽的下方进行切取，切到芽上方横向的切口处，就可以停止了。用手指将芽两侧的表皮轻轻地扒下来，长度大约在1.5厘米左右，宽度大约在0.5厘米左右。

杏树嫁接方法

另外，切接、劈接属于枝接，多在春季杏树发芽前嫁接，一般在3月上旬到4月下旬。芽接的时间会晚一些，时间多在杏树的春芽不再生长之后，多在春季和秋季，春季的最佳时间是6月份下旬，秋季的最佳时间是9月上旬。不过春季时候砧木容易出现离皮现象，所以就要加快嫁接速度。

- 4.后期管理：嫁接成活后，对砧木上的萌芽进行抹芽处理，同时用尿素或者磷酸二氢钾溶液进行叶面喷肥。天气闷热、雨水频繁、通风不良或者氮肥过量，要及时增添链霉素，防止细菌穿孔。

杏子树在嫁接完成后要及时的将帮上的塑料条解除，对于过密、过弱的枝条要及时修剪掉，以免影响生

长。

杏是我国很常见的水果，适应能力非常强，受到了很多种植农户的喜欢

杏树怎么种

一、土壤

杏树是比较耐贫瘠的果木，所以对于种植的土壤种类要求并不高，但是最优的土壤当然还是土层深厚肥沃的地区，如果当地土地太过贫瘠，虽然并不会影响杏树的正常生长，但是有可能导致后期果树生长不良，杏树结果不够饱满漂亮，对于农户来说，也是直接关系到最后的产量。所以在贫瘠的地区我们可以考虑用人工费来改善土壤，以达到最优的生长条件。

二、温度

在我们常见的各种水果中，杏树是耐寒耐旱力都非常强的果树，即使是在非常低温的环境下也能正常生长，所以杏树对于温度的要求比较广泛，这是其他的果树所不能比的。所以对于生长温度的要求并不高，但是在花期是杏树一个非常敏感的时期，这个时候如果杏树对于环境温度的要求是高于10度，只有在10度以上才能保证花蕊跟幼果不会受冻。

三、光照

杏树本身是喜光的植物，即使是在低温环境，我们也应该保证充足的光照，光照不足会直接影响杏树开花坐果，也影响着最后的产量。

四、水分

杏树本身是十分耐旱耐瘠的果树，所以其对于水分的要求并不高。而且因为杏树的根系非常的发达，所以其对于土壤中水分的掌控能力也很强，我们在浇水的时候一定要控制，观察果园土壤湿度情况，适时地补充水分。不过需要注意的是，在杏树发枝期跟果实膨大期是非常重要的时期，我们一定要在这个时候及时的补充水分，这样才能促进杏树的生长，也有利于提高产量。在浇水的时候我们一定要控制好量，不能多涝，在多雨的天气还要注意园区内的排水，以免影响果木生长。