

## 2年杏树苗，3年生杏树苗

产品名称	2年杏树苗，3年生杏树苗
公司名称	泰安市广祥农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广祥农业 规格:2年
公司地址	山东泰安高新区北集坡镇
联系电话	0538-8912686 13954886187

## 产品详情

特早大红杏 508花期抗晚霜能力极强，近几年来正值杏花萌动和开花期，砀山地区连续四年遇到 - 6.7 倒春寒袭击，本园早熟1号、金太阳、红丰、新世纪、凯特、红荷包、关公脸、菜籽黄、八斗杏等品种均受到严重冻害，几乎绝收，而特早大红杏 508却安然无恙，硕果累累，丰产稳产。特早大红杏 508对土壤、水肥、气候要求不严，山区、平原、南方、北方及我国东西部都适宜栽培。近年来，河南、山西、陕西、山东、河北、新疆、辽宁等多处引栽，均表现良好。

### 二、栽培要点

#### 1.栽植时间及定植方法

从11月中旬到翌年杏芽萌动前均可栽植，株行距一般采用2米×4米或2米×4米，亩栽植55株~83株，以树落叶后至上冻前栽植最佳，成活率可达100%。若春节后栽植，应及时浇水、树盘覆盖地膜，增温保湿，提高成活率。应选择地势高、土层深厚地建园，避免在低洼地建园，以防水淹。定植前要施足底肥，挖深、宽、长各60厘米树坑定植，底层放一些麦草、青草，表皮土放下层，底层土放上层，为确保丰产、稳产，最好按6:1配置授粉树，以极早熟1号、矮1、金太阳作授粉品种为宜。

#### 2.水肥管理

由于该品种成熟极早，果个较大，要早施肥，勤施肥，定植当年5月中下旬可株施氮肥0.5千克，施肥时根据土壤情况适当浇水；秋季每亩施基肥5000千克、饼肥50千克、二铵50千克；生长期每隔15天喷一次0.3%尿素或0.4%磷酸二氢钾液，花期喷硼砂、尿素或白糖液，以提高坐果率。

#### 3.整形修剪

特早大红杏—508适宜采取主干疏层形，在距底面50厘米~60厘米处，每15厘米选留一个大形结果枝组。

修剪时采取轻剪长放，疏除密挤枝、重叠枝、病虫枝、竞争枝、背上直立枝和强旺枝，并结合整形采取拉枝、吊枝、撑枝，扩大树冠。对果枝采取甩放不剪，留其结果。也可采用自由纺锤形，树高2.5米~3米，干高40厘米，每株有7个~9个主枝。建园当年在距地面80厘米处定干，从整形带内选留中心干和3个主枝，在50厘米处剪截。夏剪时对中心干延长枝摘心处理，冬剪时再从中心干延长枝上选留2个~3个主枝，并短截延长枝，生长季节采用拉枝措施将主枝角度调整到80度。除选留的主枝外，其余的枝条均采用夏剪摘心，冬剪缓放的修剪方法，促其成花。杏树大量结果后，应及时疏除过密枝，并适当回缩较大的结果枝组。

凯特杏幼树期修剪,凯特杏幼树期生长势旺，枝条直立，该时期修剪以短截为主，以促进分枝扩大树冠。注意开张主枝角度，选留和培养好的主侧枝，尽量多留辅养枝，以提前积累养分，提早结果，冬剪时，对主侧枝干进行短截，一般剪留50厘米。夏季对新梢摘心刺激萌发2次枝，使树冠早成形。对新梢采用扭梢、拉枝的方式，促进幼树早结果;初果期修剪初果期凯特杏仍保持较强的生长势，枝条生长较大，营养生长大于生殖生长。该期修剪，在保持好树形的基础上，不断扩大树冠，培养尽可能多的果枝组，以冬剪和夏剪相结合为好。冬剪疏除背上直立竞争枝、密生枝、交叉枝，短截非骨干枝和交叉枝，促其分枝，培养为结果枝组；夏剪疏除背上过密植和部分徒长枝。

金太阳杏及杏产品具有很好的加工性能，也是出口创汇的重要产品。杏果肉可以加工成杏干、杏脯、杏汁(杏茶)、糖水罐头、果酱、话梅和果丹皮等。杏仁可制成高级点心的原料、杏仁霜、杏仁露、杏仁酪、杏仁酱、杏仁酱菜、杏仁油、杏仁粉等。杏树的木材色红、质坚、纹理细致，可以加工成家具和各类工艺品；叶子是很好的家畜饲料；树皮可提取单宁和杏胶；杏壳是烧制优质活性炭的原料。此外，杏树也是一很好的绿化、观赏树种，尤其是在干旱少雨、土层浅薄的荒山或是风沙严重的地区，杏树是防风固沙，保土，改善生态环境，造林的先锋树种。

因看好该品种的市场前景，很多苗圃扩繁巨紫荆，其小苗价格也大幅上涨。