

新疆三黄鸡苗，阿克苏快大三黄鸡苗批发，喀什快大黑鸡苗，黄花鸡苗

产品名称	新疆三黄鸡苗，阿克苏快大三黄鸡苗批发，喀什快大黑鸡苗，黄花鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:三黄鸡苗 体重:5.2 (kg) 成活:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

三黄鸡的生长需要丰富的营养，饲养三黄鸡的饲料一是要求营养成分齐全，任何微量成分的不足或缺乏都可能出现病态反应；二是要求高能量、高蛋白质；三是要求饲料里的各种营养比例配合恰当。

三黄鸡饲养一般分为2个阶段，0~28日龄称为育雏阶段，29日龄~上市称为育肥阶段，所以三黄鸡的饲料供应也要分为2个阶段，育雏阶段饲料一般用粉料或加工成碎粒，育肥阶段饲料用颗粒饲料。

三黄鸡的饲喂采用自由采食方法。在1~3日龄，为了让雏鸡尽快学会采食，每隔2~3小时喂料一次；4~28日龄每隔4小时喂料一次；29日龄后每日加料4次。多次投料可以刺激鸡的食欲，增加鸡的采食量。每次给料时要控制给料量，使每只鸡能吃饱，还有少量余料，给料过多会被鸡啄出料桶造成浪费。

1~7日龄的雏鸡用开食盘饲喂，7日龄以后要逐步改为用料桶饲喂，12日龄后完全用料桶饲喂。料桶的高度要随着鸡的生长速度而调整，保持与鸡背同一水平，以免啄出饲料。料桶必须保证够用而且分布要均匀。在由小鸡料转换为育肥料时，要用5天左右的时间逐渐更换，不能突然改变。饲养人员应每天准确记录喂料量。

3、良好的环境

三黄鸡1-2日龄所需温度为32~34℃，此后每过一周环境温度可下降3℃，到5周龄后环境温度以20~21℃为宜，不得少于16℃。在育雏期，鸡舍内温度每天可上下波动1~2℃，造成适当的温差，可以刺激食欲，提高采食量，促进鸡的生长。

育雏周，鸡舍内保持56~70%的稍高湿度，防止雏鸡脱水，影响健康和生长；两周后鸡舍内湿度控制在55~60%。通过加强通风，避免饮水器漏水，防止垫料潮湿等措施，保持舍内的干燥。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗