

香玲核桃苗多少钱

产品名称	香玲核桃苗多少钱
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	2.70/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

薄皮核桃苗株行距平地为3X4米或4×5米。实行间作园的株行距可扩大为6~8×8~15米。坡地、丘陵地栽植密度可适当缩小。栽植坑深度和直径为80~100厘米，将40公斤农家肥与磷肥和表土混匀后回填到坑底，然后将嫁接苗立放混合土上，舒展根系后边填土边踏实，务必使根系与土壤密接，埋土至根颈以上5厘米再踏实，最后灌透水，水渗后树盘覆盖地膜或秸秆保水。为防冬季冻害和早春“抽条”，应将春植幼树压倒埋土防寒。

薄皮核桃苗定干：当幼树高度达1.5米以上时定干。早实薄皮核桃苗在80~100厘米高处定干；果粮间作园定干高度为1.5米左右。丘陵坡地定干高度为100~120厘米。

树形：核桃属喜光树种。早实品种结果早，易丰产，树冠较小，宜采用“开心形”或“双层小干形”（树高3.5~4.0米）。晚实品种生长较旺，结果稍迟，树冠较大，宜采用“中冠形”（树高可达4~5米）、“主干疏层形”（树高可达5~6米）或“开心形”。

薄皮核桃苗修剪：为避免过多“伤流”，宜在秋季落叶前和春季展叶后修剪。修剪应注意以下几点：早实品种易形成混合花芽，为调节结果量与树势的矛盾，应在整形过程中根据定产指标，剪除过多混合花芽，或在坐果后适当疏除过多幼果。此外，早实型品种易生二次枝，应及时夏剪、疏除密挤枝和重叠枝，以利透光壮枝，既可年年丰产，又可保持树势健壮。晚实品种开始结果稍迟，生长较快，应在整形的过程中，采用短截和摘心促发分枝，增加结果母枝。因其易发生“背后枝夺头”现象，应及时处理和疏除。对于内膛发生的徒长枝应根据具体情况和需要，或控长留用，或尽早疏除。

薄皮核桃苗施肥浇水：早实型品种开始结果后2~3年每平方米树冠投影面积可施肥50~60克（折尿素110~130克）、磷和钾各20克、有机肥5公斤。晚实型品种栽后1~5年，每平方米树冠投影面积每年施氮50克、磷10克、钾6~10克、有机肥5公斤。上述施肥量还应根据土壤肥力、树体长势、肥料质量具体确定施肥时间、次数和施肥数量。有机肥应在落叶前一次施入。速效肥料可在生长期分2~3次施入。为提高肥效和利用率，每次施肥后均应灌足水，水渗后松土保墒。此外，春季雨少干旱应及时灌水补墒；落叶后冻土前应灌冻水。生长季主要灌水时期为：萌芽水、幼果速长期水、硬壳期水。人工辅助授粉：核桃雄花出现较晚，早实核桃雌花出现较早，为提高坐果率，应人工授粉。可采结果大树上初开的雄花序，挂在结果幼树上方自然落粉；也可采取花粉后用滑石粉稀释3~5倍放入三层纱布袋中，在幼树上方人工抖授。

土壤管理：春秋两季进行树盘浅翻20厘米。每3~4年沿树行在树冠投影两侧，挖宽、深各40厘米的沟，沟底放入枯枝落叶和有机肥，随后灌水，水渗后填土封沟，促进生长和结果。丘陵坡地应及时维护水土保持工程。今年出圃核桃苗10万棵 品种 香玲 辽核 鲁光 元丰 8518等，保湿邮寄 回程车调配及时。