

水产饲料稳定性国家标准 宏德大农 上海水产饲料

产品名称	水产饲料稳定性国家标准 宏德大农 上海水产饲料
公司名称	成都宏德大农生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市人民南路三段24号B栋603室
联系电话	15388125570

产品详情

水体中的浮游植物是自然水体中的原始生产者，它吸收水域中的氮磷钾等营养素和二氧化碳，利用光能进行光合作用而得以大量繁殖，成为水域中基本的饵料资源，上海水产饲料，也是水色的主要因素之一。

水体中的浮游动物主要以浮游植物和有机碎屑为食，是水域中的消费者，对水色变化的影响也很大，但它也是鱼类良好的天然饵料。

池塘好水的标准是：呈油绿色或黄褐色，上午水色较淡，下午渐浓。

水的透明度在30厘米左右，表明肥度适中，可进行正常投喂。

透明度大于40厘米时，水质太瘦应增加投饲量。

透明度小于20厘米时，水质过肥，应停止或减少投饲。

当水质过瘦时，水产饲料a料b料区别，鲢、鳙鱼会出现头大、尾小、背窄、游动无力的现象，甚至有瘦弱残废的个体漂浮水面，这表明水中浮游生物过少。

主养鲤鱼的水面可根据水的浑浊度来确定投喂的多少，如整池水都很浑浊，呈泥黄色，排除大雨或人为的原因，可证明鲤鱼在池底活动极频繁，不断拱泥而致水体浑浊，由此可判定鲤鱼处于饥饿状态，应加大投喂量。

草鱼的症状

草鱼病发病初期，病鱼头部、背部体色由绿变黄，肠道内无食或有少量食物，肠内可见淡黄色粘液，镜检粘液可见大量点状产气单胞菌、大肠等；发病中期，病鱼头部、背部体色有黄变黑，解剖鱼体可见肠壁局部充血发红，肠道内淡黄色粘液增多；发病后期，病鱼体色发黑，解剖鱼体可见整个肠壁充血发炎，呈红色或紫色，水产饲料稳定性国家标准，肠道内产生大量脓血，。2龄以上的大雨病情严重时，外突，腹部膨大，腹腔内有淡黄色积水，肠管内有大量的液体，拎起病鱼头部即有淡黄色液体流出。

防重于治：清明节前后容易出现鱼苗现象，因此清明节前任何池塘都要做次预防，可选择科洋鱼虫杀星、蛛虫杀星、鱼用、克虫王B1，B2，B3任一种药均可，第二天使用强氯精、毒克、克毒灵、菌素杀等全池泼洒，进行杀菌。

肤霉病白鲢

（一）症状：病状病鱼体表或鳍条上有灰白色如棉絮状的菌丝，故又称白毛病。严重时菌丝厚而密，鱼体负担过重，游动迟缓，食欲减退，终至。有时菌丝着生处有伤口充血或溃烂。

（二）病原体：同丝水霉（*Saprolegnia monoica*）曾在金鱼、红鲤上发现。寄生水霉（*S.parasitica*）曾在金鱼、红鲤体上和鲤、金鱼的卵上发现。

（三）危害和流行情况：据报道，水霉和绵霉腐生性寄生物，水产饲料原料的特点，专寄生在伤口和上。鱼类型患水霉病的原因，主要是由于、搬运时操作不小心，擦伤皮肤，或因破坏鳃和体表，或因水温过低皮肤，以致水霉的动孢子侵入伤口。当水温适宜时（15度左右），3-5天就长成错综交叉的菌丝体。如伤口继发性细菌，则加速了病鱼的。水霉全年都有存在，秋末到早春是流行季节。此病是金鱼、红鲤和锦鲤的常见病。多发病，我国各地都有流行。

（四）防治方法：

- 1、加强饲养管理，避免鱼体受伤。在越冬以前，根据显微镜检查结果，用处理杀灭，可以有效地预防此病。
- 2、用孔雀绿0.1%-1%浓度水溶液涂抹伤口和水霉着生处。
- 3、用孔雀绿1:15000浓度浸洗3-5分钟。
- 4、用400ppm-500ppm和碳酸氢钠400ppm-500ppm浓度合剂全池遍洒。因用药量大，通常将病鱼集中在小水泥池中进行施药。
- 5、用维生素E内服，药量与防治竖鳞病完全相同。
- 6、创造有利于鱼卵孵化的外界条件（注意水温、鱼卵密度），用1:15000浓度孔雀绿浸洗鱼卵（连同鱼巢一起）10-15分钟，可预防鱼卵水霉病。

水产饲料稳定性国家标准-宏德大农-上海水产饲料由成都宏德大农生物科技有限公司提供。成都宏德大农生物科技有限公司（www.hddnswkj.com）为客户提供“技术推广,销售,饲料”等业务，公司拥有“宏德

大农”等品牌。专注于植物性饲料等行业，在四川成都
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闻经理。