

山东蓝莓品种苗基地蓝莓种植选地定植

产品名称	山东蓝莓品种苗基地蓝莓种植选地定植
公司名称	泰安开发区新兵园艺场
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝莓苗 型号:技术指导 规格:四年苗
公司地址	开发区北集坡街道办事处
联系电话	0538-8912766 13181823333

产品详情

山东蓝莓苗种植基地

蓝莓选地整地 蓝莓苗的园地应选择土壤pH值在4.3~5.5,有机质含量为8%~12%,且土壤疏松、通气性好,排水良好、交通方便的地方。园地选好后,在定植前1a进行深翻熟化,深翻的深度控制在20~25cm。土壤的pH对蓝莓苗的生长影响较大,不同品种的蓝莓苗对土壤的pH要求不同。兔眼蓝莓苗要求土壤的pH在4.3~5.3,北高丛蓝莓苗在pH为4.3~4.8的土壤中生长最好。如果土壤的pH值超过了蓝莓苗生长的适宜pH,应使用酸性草炭土或硫磺粉进行调整土壤的pH。土壤的pH值在5.5以下时,使用酸性草炭土对园地土壤pH进行调整;土壤的pH值在5.5以上时,使用硫磺粉进行调整。使用硫磺粉调整园地的pH,应在种植前3~4月进行,防止硫磺粉伤害蓝莓苗幼苗的根。调整土壤pH的方法分为全面调整和局部调整2种方式,全面调整就是对园地进行全面改良,该方法取得的效果较好,但是成本较高;局部调整仅对种植穴中土壤进行调整,操作简单,但是相对全面调整其效果较差。如果园地中有机质的含量低于8%,应对园地施加适量的草炭等有机质,以增加土壤中有机质的含量绿宝石蓝莓苗品种介绍,以及种植技术。

整地结束后对园地进行起垄栽植,垄高控制在25~30cm,垄宽控制在1.2~1.5m,并将蓝莓苗栽植在垄背上。蓝莓苗的栽植分为春栽和秋栽2种,进行秋季移植时,如果冬季对蓝莓苗幼苗管理不当易受到冻伤,影响幼苗的成活率,因此以采用春栽为宜。春栽时间一般选择在每年的3~4月,且幼苗新芽萌发前进行。为了提高苗木的成活率,一般选择2~3年生且高度在30cm以上的苗木进行移栽。对蓝莓苗进行移栽前,应在垄背上挖宽度0.5~0.8m,深度为0.2~0.3m的定植穴,并在定植穴底部填入一些酸性的草炭土或者栽培土,然后将苗木放入穴中,保证其根部充分展开;回填栽培土,在回填过程中轻提幼苗1次,使幼苗的根部与种植土充分结合,最后覆土使其与垄面相平,并在定植穴周围覆盖0.10~0.15m的碎玉米秸、稻壳等有机质,起到调节地温、保持土壤水分以及抑制杂草生长的目的。不同品种的蓝莓苗其株行距不同,一般高丛蓝莓苗的行距控制在2.0~2.5m;兔眼蓝莓苗的行距控制在2.5~3.0m,半高丛蓝莓苗和矮丛蓝莓苗的行距控制在2.0m左右。根据土壤肥力情况,可以适当的增大或减小蓝莓苗的行距。由于兔眼蓝莓苗自花不结果实,一般选用高丛蓝莓苗对其进行授粉;高丛蓝莓苗和矮丛蓝莓苗自花结实率较高,但是对其配置授粉树可以提高果实的产量和品质,所以进行蓝莓苗栽培时一般都对其配置授粉树。配置方式一般按主栽培品种与授粉品种2:1或1:1的比例进行栽培,即主栽培品种每隔1行或者2行定植1行授粉树

。在蓝莓苗种植后的第2年，部分园地的土壤pH值会出现上升，需要定期检测园地土壤的pH值，并控制园地土壤的pH值，保证蓝莓苗正常生长。