

山东无花果苗品种介绍

产品名称	山东无花果苗品种介绍
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	2.20/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

幼树要春、夏、冬三季各进行一次中耕除草，冬季中耕要结合培土，以免根系冻害，成年树移栽休眠期进行中耕，夏季要盖草，以免杂草肆虐，还能防旱保墒。如果仍有杂草滋生，可以割草覆盖根系，在冬季时可以适当作物间作，在冬季寒冷地区要注意防寒。

成年果园每亩要消耗氮8-10公斤、磷5-8公斤、钾8-10公斤，施肥时种类不限制，但以堆肥、农家肥、草木灰为主，基肥要在无花果休眠期施入，这其中氮肥要占三分之二，钾占一半，磷肥可以全部施入，其余肥料可在6-7月施入。无花果的枝梢生长期和果实收获期都很长，所以对氮钾肥供应要相应的延长，不可中段。种植在土壤粘重的地块时，植株的根系都分布在土壤表层，如果遇炎热气候，地面干燥，易受旱害，所以要及时浇水，补充土壤湿润，促进根系生长。在没有进行间作的地块上，在夏季时要盖草保温保湿，既能部分地表须根，还能增加土壤有机质含量，增加肥力。在地势低洼种植时，或少浇水不当或者雨后积水，要及时排水，以免沤根。为了控制株型，提高结实率，每年要在植株休眠是进行适当的修剪，具体修剪为主枝和副枝。为了塑造熟悉，幼树三个主枝要留60厘米左右进行短截，在先端留一个剪口芽，使其向同方向延伸。当延长枝生长到一定程度时，在将其进行短截，所留长度不宜超过主枝。

无花果不管是使用哪种繁殖方式，通常都是育苗床育苗，然后再移栽大田定植的基本流程。当成功出苗或者是枝条扎根出叶后，便可开始移栽了。定植前要对土壤进行翻耕消毒的工作，提高土壤的肥力，促进幼苗的生长。在定植时要控制好定植密度，因为无花果树长大后的树形是比较大的，种植过密的话，树体会互相遮挡挤压，不利于开花结果。在前期可适当间作一些低杆作物，提高土地的利用率。

金傲芬为鲜食用无花果优良品种。也是夏秋果兼用品种，以秋果为主，7月下旬至10月下旬果实成熟。果皮金，有光泽，似涂蜡质；果卵圆形，果颈分明，长6.7厘米，果目微开；果实个大，单果重70—110克，大160克；果肉淡，致密，可溶性固形物含量为18%—20%，味浓甜，鲜食极佳，品质极好。

该品种树势较旺，枝条粗壮，分枝少，年生长量2.3—2.9米，树皮灰褐色，光滑。叶片较大，掌状5裂，叶缘具微波状锯齿。山东嘉祥地区3月18日至4月12日萌芽，3月26日至4月16日展叶并开始新梢旺长，夏果3月21日至4月14日现果，成熟期7月18日；秋果6月1日现果，8月上旬成熟，11月初落叶。

该品种较耐寒。可采用丛状形、Y字形、一字形或多主枝自然开心形等树形，较丰产稳产。

波姬红：1998年由美国得克萨斯州引入我国，已在山东、河北、四川和河南等地引种栽培。为鲜食大果型红色无花果优良品种。系夏秋果兼用，但以秋果为主的品种。果皮鲜艳，为条状褐红或紫红色，果肋较明显，果柄短，果实长卵圆或长圆锥形，秋果平均果重60—90克，大果重110克以上；果肉微中空，为浅红或红色，可溶性固形物含量16%~20%，汁多，味甜，品质极佳。山东嘉祥地区成熟期为7月下旬至10月下旬。

该品种树势中庸，树姿开张，分枝力强。新梢生长量可达2.5米，枝粗2.3厘米，节间长5.1厘米。叶片较大，多为掌状5裂，叶缘有不规则波状锯齿。该品种耐寒、耐盐碱性。宜采用Y字形、一字形或杯状形等树形。极丰产。

布兰瑞克：原产于法国的夏秋兼用品种，是我国目前集约栽培面积较大的黄色品种。该品种树势较中庸，细枝发生多，随树龄的增高，生长逐矮化，节间短3—5厘米，叶裂刻较深，通风透光性好，叶色深绿，光合性能强。果基部黄绿色，顶部浅红色，果肉红褐色，随昼夜温差的增大甜度增加，果皮色变深。成熟果以中后期鲜食佳。可溶性固形物含量18%，夏单果重一般80克左右，秋单果重40—60克。具芳香味，品质上层。是加工制品的优良品种。泰安开发区忠信苗圃坐落于泰山脚下。首先，谢谢大家对本网站的关注，我们有自己的苗圃，采穗圃，以及成品示范园，苗圃现有200余亩，是我们本地同行业的龙头企业，从事本行业有20余年的历史。本公司一贯秉持“品质、信誉、服务”至上的经营理念和“诚信经营、质优价廉”的服务宗旨，深得果农和同行的高度信赖和赞扬。欢迎新老客户前来实地考察指导，专车接送今年出圃无花果苗10万棵，品种：布兰瑞克 金傲芬 青皮 波姬红等