

# 商丘周至县翠香猕猴桃苗木畅销全国

产品名称	商丘周至县翠香猕猴桃苗木畅销全国
公司名称	西安坤威农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市周至县司竹乡（猕猴桃园区内）
联系电话	18092724583

## 产品详情

猕猴桃苗木定植当年重短截，萌发的新梢选留一个粗壮的枝而抹除其余新梢，通过摘心促壮培养保留的新梢为主干，冬季在较高部位饱满芽处短截。第二年春选留剪口下处2个着生方位适当的健壮新梢作为架面两边的主蔓培养，用枝干扶直，其余新梢摘心或疏除，作为主蔓的新梢7—8月将其倾斜，冬季轻剪后放平绑扎于架面中央铁丝上。第三年在主蔓顶端培养主蔓延长头扩大架面，同时培养侧蔓，一般在架面上每隔40—50厘米交错位置选留侧蔓，垂直于主蔓方向均匀分布，多余的密枝及主干上短的辅养枝全部疏除。第四年继续培养主蔓延长头的侧蔓及侧蔓上的结果母枝，结果母枝分布间距为30厘米，结果母枝要粗壮，基部芽饱满，在架面上分布均匀，不能交叉重叠，株间交叉时及时回缩。第五年培养结果枝组，树体骨架基本成形。

红阳猕猴桃栽培3主要物候期主要物候：伤流期：红阳猕猴桃任何部位受伤手不断流出树液的时期就是红阳猕猴桃的伤流期。一般在早春萌芽前约半个月到萌芽后的一段时间，为期近2个月，在广元地区约为2月上旬至4月下旬。萌芽期：指全树有5%的芽的鳞片裂开的时期，露白，一般为3月上旬、中旬。展叶期：指全树有5%的枝蔓基部现蕾的时期，一般为4月上旬。始花期：指全树有75%的花朵的花瓣凋落的时期，一般为4月下旬至5月上旬。新梢第1次生长期：指全树有5%的新梢开始第1次生长的时期。一般在4月中旬至5月下旬。果实迅速生长期：指果实坐果后开始生长至75%果实的体积停止迅速增长的时期，一般为5月上中旬至7月上旬。二次新梢生长期：批全树有5%的新梢开始第二次生长的时期，一般在7月中旬至9月中旬果实成熟期：指果实采收后，经后熟，能显现出其固有品质，种子饱满呈深褐色的采收时期，一般为9月中旬以后。落叶期：指全树有5%--7%的叶脱落的时期，一般为12月中下旬。休眠期：指全树有75%的叶脱落到翌年伤流期开始之间的时期，一般为12月下旬至次年2月上旬。

红阳猕猴桃一般在酸性、微酸性或中性土壤上都能健康生长，且结果良好，一般在PH值5.5~7范围内生长良好，在PH值7.5以上的偏碱性土壤上，则出现缺铁黄化现象。在栽培中，碱性土亚铁改良，酸性过重土可用石灰、草木灰等调节。土壤蝇的矿物质营养对红阳猕猴桃生长直接的影响，据调查，适宜猕猴桃生

长的土壤有机质含量为3%~17%。红阳猕猴桃发育良好的土壤养分平均含量为：有机质3.1%, $P_2O_5$ 0.12%， $K_2O$ 3.39%, $CaO$ 0.86%, $MgO$ 0.75%,  $Fe_2O_3$ 4.19%,这种土壤中矿物质营养丰富，立地条件优越。在栽培中还要注意通过增施有机肥来调整土壤的团粒结构、腐殖质含量、养分含量以及酸碱度，以创造适宜红阳猕猴桃生长的土壤环境。