

白术种苗,改良白术苗批发,安国改良白术芽子价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 白术种苗,改良白术苗批发,安国改良白术芽子价格 |
| 公司名称 | 亳州市谯城区俊杰中药材种植专业合作社 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 发芽率:95% 规格:改良品种 种植时间:春秋 |
| 公司地址 | 亳州市谯城区十八里镇集东村 |
| 联系电话 | 13966882080 18455883888 |

产品详情

白术种苗,优良品种白术苗,改良白术芽子批发价格

白术苗,白术种苗,改良白术苗价格,改良白术芽子多少钱,白术苗价格,改良白术苗价格,白术种子价格,改良白术种子价格,改良白术苗批发,白术苗厂家

别名:白术苗,白术种苗,白术秧子,白株芽子,白术芽子,改良白术苗产品用途:白术根部入药主产区:安徽亳州

安国 磐安生长周期:用种子两年,用苗一年收苗用量:用苗100-150公斤/亩 株距:10-15公分

行距30公分育苗: 种子10公斤/亩亩产量: 鲜货1000-1500公斤 干货400-450公斤

市场价格:20-30元/公斤种植时间:10月份-年底 忌重茬温馨提示:网上种子种苗信息鱼龙混杂,林子大了什么鸟都有,为了你们的利益,千万不要购买特别便宜的种子.购买种子种苗请认准【俊杰药材种苗】.以下是详细的种植技术:

白术市场分析 白术前年降价之后,去年种植面积锐减,加之去年主产区之一亳州水涝减产,白术经过一年多消耗,据商家进行调查的人讲,各地存量不大,特别是2009年秋来安国购买白术种秧的亳州、浙江人极少,预示明年白术面积不大(这里告诉药材生产者一定要把药材生产坚持下来!).

说明：白术生产出产品，种植种子，一年生长的个头较小，也可药材用，但价格较低，如不卖药材作为白术秧子，栽到地里生长一年，个头较大，价格也较高。河北安国以播种种子为主生产白术药材，安徽亳州、浙江两个主产区以栽种秧苗生产白术药材。但两地种植当地生产的白术秧子，其产量和质量都远不如用河北安国的白术秧子。这是地理差异自然造成的，没有办法解决。两地只有年年秋季购买安国生产的白术秧子（秋季就已栽到地里）。两地都是白术的主产区，产量占全国很大一部分。

所以才分析说来安国购买白术种秧的亳州、浙江人少，预示明年白术面积不大，产量也会不大。商家预计，白术年后价格不会下跌，有可能秋天产新，因产量小价格再上一个新的台阶。因白术每年用量较大，眼下虽有库存，但数量不大，长期来看，价格还会上升。业内专家说药农应当积极种植，精心管理，今年秋收获时必赶上好价格行情。安国供种秧产区也应适当扩种，以赶秋来起价。另外安徽亳州三年两涝，今年再涝白术更会大涨。

浙江白术26-32元公斤，亳州25-32元公斤，湖南23-30元公斤，河北14-18元公斤。白术生长期1-2年，种子直播生长一年即可出售，每亩需种子8-10公斤。但个小，等级低，价格相对2年生较低。第2年以年的根茎为种秧栽种，每亩需种秧100-150公斤。白术成品的生长期为两年，一年的白术用作种秧，也可直接卖药材干货。播种按行距25厘米，划浅沟，播深1厘米左右。不间苗。白术种子种植当年亩产鲜货1800-2000斤，干货350公斤。栽培种植技术 白术为多年生草本，高30~60

厘米，花期9~10月，果期10~11月。喜凉爽气候，怕高温，较耐寒。高温对白术生长不利，易诱发立枯病，白绢病等病害，造成根茎腐烂而死。白术怕干旱、也怕水渍，以排水良好的砂壤土为宜。忌连作，也不能与花生、白菜、西红柿、萝卜、马铃薯、茶叶及玄参、生地、白芍、穿心莲、附子等轮作。前茬为禾本科作物。但新垦荒地也可栽种白术。

一、栽培方法 1

、选种育苗 （1）选种：辨别种子真假，白术新种子偏红有绒毛，表面光泽，断面清晰，中间芽胚有一粉色状线。（2）育苗浸种，种子先在25~30

温水中浸一昼夜。育苗春秋均可，头年育苗，次年移栽。春播在3月下旬至4月上、中旬，以地温12以上播种为宜。在整平耙细的畦面上横向开沟条播，行距15~20厘米，播幅7~10厘米，沟深3~5厘米，沟底要平整。将选好处理过的种子再在50%的甲基托布津1000倍溶液中浸泡3~5分钟，预防铁叶病。将凉干的种子与沙子拌匀撒入沟内，用脚踩稍实，复盖草木灰，以不见种子为度，再撒一层过磷酸钙或饼肥，掩上薄土，可盖一层干草保温保湿，以利种子出苗，出苗后逐次去除。每亩用种量5~8公斤，高苗1亩可移栽大田7亩。若点播，按行距20厘米，株距10厘米，穴深3~5厘米，每穴种子3粒，7天左右可出苗。（3

）苗期管理：苗出齐后中耕除草，做到田间无杂草，土壤不板结。苗高7厘米时按株距3~5厘米定苗。幼苗怕渍水又怕干旱，排灌要及时。2~3片真叶时第1次追肥；7月上旬地下根茎膨大期第2次追肥，每亩用粪水500~800公斤，生长后期尽早摘去花蕾，以促进根茎生长。 2

、贮苗方法：为了安全过冬，须将幼苗挖起贮藏。播种当年10月上中旬~11月上旬，选晴天土干时挖起幼苗，抖掉泥土，剔除病弱苗和破损苗，将其摊放在通风处阴干，待外皮发白再贮藏，以免发生霉烂。

（1）缸罐贮藏：少量幼苗可贮藏在缸罐中过冬。在容器中间插放一把稻草，以透气散热，底部和四壁先铺一层青松叶，再装白术苗，上面盖青松叶或干苔藓；青松叶枯黄后，及时更换，以保持

足够的水分。 (2

) 砂藏法：量多时可用此法。在阴凉通风的室内，先用砖头或石块砌成方围，再在泥土地上铺 3~4 厘米厚的细砂，将幼苗分层叠放，即一层幼苗，一层砂，每隔 0.6~1 米插 1 个草把，当堆至 35 厘米高时，复盖 7 厘米厚的砂或泥土封顶，上放杉树刺，以防鼠害。冬季气温较低时，再加盖一层稻草。砂土须于湿适中，每隔 15~30 天翻堆检查一次，及时扯去病苗。 (3

) 就地越冬：秋播的白术苗可上复盖干草或薄膜，就地越冬。次年春季随挖随栽。 3

、大田栽培技术 (1) 选好种苗：应选取顶端芽头饱满，根系发达，表皮细嫩，顶端细长，尾部圆大的根茎作种，按大小分类，分开种植，可使幼苗整齐，便于管理，提高产量。 (2

) 栽种时间：要根据当地气候、土壤与耕作制度而确定移栽期。从 12 月下旬开始至次年 4 月上旬。以早栽为好，早下种的先发根，后长芽，根系发达，长势旺盛，耐寒、抗旱性强，产量高。而种得太晚的，因气温升高，先长芽，后长根，根系发育不良，产量较低。 (3) 栽种方法：有穴栽和条栽。种植密度视土壤肥力与肥料条件而定。适当密植可提高产量。每亩基本苗为 8000 ~ 15000 株，用苗 40 ~ 60 公斤，按行距 23 ~ 26 厘米，株距 13 ~ 16 厘米穴植，穴深 7

厘米。先施人粪尿，待干后将幼苗放穴中，使芽头向上，须根舒展，再盖土埋住，顶芽距土表 3.5 厘米。埋得太浅易受冻害，则芽多，术形不好；反之，埋土过深，发芽慢，出土困难，术形细长，质量也差。

二、田间管理技术 1

、中耕除草：白术出苗后要勤除草、浅松土，保持田间无杂草。 5

月中旬植株封行后，只除草，不中耕。早晨露水未干时不宜除草，否则易感染病害。 2

、追肥、白术生育期长，为 220 ~ 240 天，栽种前除施足基肥外，还要追肥 3 次，第 1 次 4

月上旬，白术地上部分生育旺盛时期，每亩粪水 800 公斤；次 5 月下旬，每亩施粪水 500 公斤；第三次 8 月中旬至 9 月下旬，每亩施粪水 2000 公斤，饼肥 100 公斤。此外在白术起挖前 40 多天内，用 1% 过磷酸钙溶液喷施叶面肥，可提高产量，每 10 天喷 1 次，共喷 2 ~ 3

次。总之要掌握“施足底肥，早施苗肥，重施蕾肥”的原则。 3

、排灌、白术怕涝，土壤湿度过大，容易发病。 4 ~ 6 月雨季及时清理畦沟，排水防涝。 8

月以后根茎迅速膨大。需充足水分，遇干旱要及时浇水，以保证水分供应。 4

、摘蕾、摘除花蕾，减少养分消耗，促使营养物质集中于根部白术在 7 月上、中旬至 8

月上旬现蕾，但尚未开放时，分 3 ~ 4 批摘完。动作要轻，一手捏住茎，一手摘蕾。雨天或露水未干不能摘，以防病害侵入。留种宜选生长健壮、叶大、分枝少的植株，留顶部发育饱满的大花蕾 5 ~ 6 朵，其余的蕾摘除。于 11 月上旬，当植株基部叶片萎黄。花内冠毛显露时，收割全株，除去根茎作药材后，扎成小把，置于通风阴凉处凉干，隔 1 个月取下脱粒，扬净杂质，雨晒干 1 ~ 2

天，放通风干燥处贮藏。 四、采收与加工 1、采收期：定植当年

10 月下旬至 11 月中旬，当茎杆由绿色变枯黄至褐色时采挖。选晴天挖起全株，抖去泥土，剪除茎杆，留下根茎，即为白术。将叶苗拣去杂质凉干，即为白术苗。 2、加工：白术挖出后要立即加工。

切勿堆积与曝晒，以防发热，抽芽和出油。加工方法有晒干和烘干。晒干的白术称生晒术，日晒 15 ~ 20 天，直至于燥。烘干的白术称烘术。烘烤火力不宜过猛，温度 50 以不感到烫手为宜。烘 4 ~ 6

小时后，上下翻动一次，使上下受热均匀，细根自然脱落，再烘至八成干时，取出堆积5~6天，使内部水分外渗，表皮变软，再行烘干即可。以个大、体重、无空心、断面白色者为佳。用竹篓装好，外套麻袋，贮于阴凉通风处，防止虫蛀、鼠害和油霉。每亩约产鲜药材1000公斤，折合干货350公斤。