

咸阳灭蟑螂灭老鼠专业除虫灭害，攻坚克难

产品名称	咸阳灭蟑螂灭老鼠专业除虫灭害，攻坚克难
公司名称	咸阳科林保洁有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市秦都区人民中路16号中宏大厦18层4号
联系电话	18209294137

产品详情

咸阳科林灭蟑螂除老鼠公司专业为商场、超市、酒店、宾馆、餐厅、食堂、学校、医院、宿舍、写字楼、办公楼、工厂、仓库、家庭等场所提供灭老鼠、灭蟑螂、灭蚊蝇、灭蚂蚁、灭跳蚤、灭臭虫、灭白蚁等一切有害生物。

在咸阳西安常见的蟑螂都有哪些种类呢，咸阳灭蟑螂除蟑螂公司科林给大家说说

美洲蟑螂

美洲蟑螂为本省一般住家内，最多且最活跃之种类。体红棕色，大型，体长约30~45公厘。前胸背板近于扁平，其周缘部具黄白色轮纹；触角长度超过体长；雌雄成虫之翅甚发达，超过腹部末端。性喜温暖潮湿，常栖息于厨房、餐厅、潮湿之地窖或墙脚之缝隙。美洲蟑螂每一雌虫一生可产15~84个卵鞘，卵鞘形似荷包或扁豆。每一卵鞘含14~24个卵，通常为16个，排成两列。卵期约一个月，在26℃下之若虫期约300日。若虫因环境条件之不同，脱皮9至13次。美洲蟑螂成虫寿命在个体间之差异很大，从100日至800日不等，平均为450日。

澳洲蟑螂

澳洲蟑螂在台湾属全省性分布，为常见之居家性蟑螂，数量较美洲蟑螂为少。体色红棕，形态与美洲蟑螂类似，惟体型较小，体长25~35公厘。成虫前胸背板之边缘有一黄色区，前翅前缘部有显著之黄色纵带，雌雄成虫前后翅均发达。澳洲蟑螂生活习性栖所与美洲蟑螂类似。雌虫一生可产20~30个卵鞘，卵鞘较美洲蟑螂为长。卵期约40日，若虫期约一年，成虫之寿命亦约为一年。咸阳专业除蟑螂/灭蟑螂/杀蟑螂公司

家屋蟑螂

家屋蟑螂体色特殊而与其它居家性蟑螂不同。体为中大型，体长约25~32公厘，黑褐或黑色，头顶部呈黄色；胸及腹部背面具鲜明黄色之斑纹，故亦称花斑蟑螂。前翅退化成小型叶片状，后翅缺如。尾毛细长，具14节。本种蟑螂生活于住家内外，在厨房、卧房、储藏室及猪舍等均有发现。每个卵鞘含卵约22

个。若虫期约300天，成虫寿命约半年。咸阳专业除蟑螂/灭蟑螂/杀蟑螂公司

灰色蟑螂

灰色蟑螂成虫体灰色，上具浅黄色斑点，体长24~30公厘。前胸背板两侧近边缘处，各有一条黑色条纹。雌雄成虫之翅均未达于腹部末端。因其前胸背板花纹类似龙虾，故灰色蟑螂又名龙虾蟑螂。偶而发现于住家、仓库、饭店、旅馆、市场中。灰色蟑螂之每一卵鞘内有26~40个卵。当卵鞘自母体排出时，卵即孵化为若虫。若虫期约80天，成虫寿命约一年。

潜伏蟑螂

潜伏蟑螂体为暗棕至黑色，中型，长约15~24公厘。前胸背板暗棕色，其前缘有一狭长淡黄色带。翅为淡黄色。腹面淡黄乃至黄棕色，与前胸形成一明显对比，故亦称双色蟑螂。雌雄成虫翅均发达，前翅前缘有淡黄色纵纹。若虫为暗色，触角甚短，基部周缘具黄色轮纹。本种之正常生殖方式为孤雌生殖，卵胎生。每一雌虫可产1至5胎，平均约3胎。每一卵鞘的卵数变化很大，平均约26个卵。在18~20℃下，若虫期约150天。成虫平均寿命约300天。喜栖息乡间厨房、屋檐下、垃圾堆下。野外生活者，在石头下掘穴钻土潜伏，以植物为食。咸阳专业除蟑螂/灭蟑螂/杀蟑螂公司

棕色蟑螂

棕色蟑螂外形与美洲蟑螂极相似，常易混淆。体型较美洲蟑螂为小，体长约25~35公厘。前胸背板亦有轮纹，惟美洲蟑螂之轮纹较白且明显，本种则较为棕色而不明显。棕色蟑螂生活于住家内外，如厨房、浴室、猪舍、排水沟、树皮中等。每一卵鞘之卵数较美洲蟑螂稍多，平均约24个。卵期约2个月，若虫期约3~

蟑螂疾病传播对人类的危害

从住家环境采得之蟑螂体上，确实可分离出病原微生物，但牠们是否是病原的媒介者，则仍受争议。柯氏曾发现蟑螂与食料接触及遗留排泄物而传布疾病。霍姆斯与尼尔森之试验显示，德国蟑螂取食含有细菌之食料后，再给以无菌之食料，能将所携之细菌遗留于该食料上。隆费罗曾检查蟑螂之胸部、足部及口器等处，发现有多种球菌及杆菌附着在上面。巴博亦报导，美洲蟑螂摄取染有霍乱病人之粪便后，能藉粪便染及食料。麦可菲也在美洲蟑螂肠内发现肺结核菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌等细菌以及赤痢变形虫等之包囊(cyst)。其它许多学者之研究指出，由蟑螂粪便中尚能找出蛔虫、绦虫、血吸虫及钩虫等寄生虫之卵。罗素及魏里斯证实，有18种居家蟑螂能传递病原菌。美洲蟑螂、东方蟑螂及德国蟑螂亦成为某些寄生虫之中间寄主。蟑螂为过敏原之携带者，为住家中引起过敏之普遍来源，体质敏感的人吸入或摄入蟑螂的过敏原时，会产生过敏反应。