

无花果苗批发价 无花果苗基地出售

产品名称	无花果苗批发价 无花果苗基地出售
公司名称	泰安开发区永信园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	品种:至诚 种苗:大田苗 种植:嫁接苗
公司地址	南部开发区
联系电话	15666930308

产品详情

无花果苗批发价泰安开发区永信园艺场出售无花果苗，无花果苗品种：波姬红，金傲芬，布兰瑞克，日本紫果，青皮，无花果苗短枝的强度，幼树和成年树的主枝和侧枝可以适当地截断更长的时间，并且应该用2到3个短枝或部分缩回的隐藏芽来更新形成的雌枝，以防止生成的雌枝从上升。同时，去除干树枝，患病树枝和昆虫树枝以及受干扰的树枝，以稳定树木的结构和树冠大小。生长期修剪主要是为了及时清除根up，新芽和短枝，疏密枝条，保持良好的通风和透光条件。新芽的20至25片叶子散开后，进行打顶以控制生长，促进分支，增加分支数量和增加产量。摘心后，应及时清除多余的树枝和芽。

灌溉的无花果具有发达的根系，并且相对抗旱。但是，由于叶子大，树枝和叶子的旺盛生长以及大量的水蒸发，因此需要更多的水。因此，必须根据情况及时补充水分。无花果的主要水分需求是发芽，快速芽生长和果实生长发育。除了传统的沟灌方法外，还可以在特定条件下进行滴灌和喷灌。无花果不能一次浇太多，尤其是在果实成熟的收获期。为避免土壤水分过度变化，我们应始终保持稳定且适当的土壤湿度，以免开裂加剧。另外，无花果具有很强的抗旱性和抗涝性。在雨季，应特别注意及时排水，雨后应及时标出潮湿的土壤。

无花果相对容易切割和修剪，并且修剪和整形的技术要求不高。通常，使用多个主枝进行自然的幸福形修剪，但整个植物应保留3-5个主枝，而没有侧枝。上。在幼树期，要着力于主枝的种植，并注意提高主枝的角度，以促进多个枝条，达到迅速扩大树冠的目的。进入初果期后，抓住大量栽培枝条，促进一定产量的形成。在整个果实期，要注意培养主干树枝，并更新大中型树枝以剪断弱枝。对于树木衰老或严重的病虫害，您可以使用基部或分支的芽或隐藏芽来重新种植主要分支和分支组。

青皮无花果苗鲜食、加工兼用优良品种。该品种适应性广，南方栽培注意控制旺长。树势旺盛，树冠圆长形，主干明显，侧枝开张角度大，多年生枝灰白色。叶大粗糙，色深亮绿，背生茸毛，黄绿，掌状分裂，通常3 - 5浅裂，裂刻长度不足叶长的1/2，少全缘，基部深心形，叶缘具明显的波状锯齿、圆钝，叶形指数1.12，叶柄平均10.32cm。果实扁、倒圆锥形，果形指数0.86左右。果实熟前绿色，熟后黄绿色，果肉淡紫色，果目小，开张，果面平滑不开裂，果肋明显，果皮韧度较大，果汁较多，含糖量高，夏秋两季果。

波姬红无花果苗鲜食红色大型无花果优良品种。该品种树势开张，耐寒耐盐，始果部位低，极丰产。果实以秋果为主，果皮鲜红色或紫红色，果肉红色或浅红色，品质口感极佳。该品种是鲜食大型红色最佳品种。树势中庸、健壮，树姿开张，分枝力强，新梢年生长量可达2.5米，枝粗2.3厘米，节间长5.1厘米。叶片较大，多为掌状5裂，裂刻深而狭，叶径27厘米，基出脉5条，叶缘具有不规则波状锯齿。

无花果幼树生长期，如果基肥不足，应施肥。该方法是在距主根约40厘米处向植物施约5千克腐烂的成熟肥料；成熟的树木应使用约15公斤的成熟农家肥料腐烂，并在落叶前后施用基肥。无花果是更肥沃的果树。由于新芽更耐干旱和涝灾，因此在果实生长和果实膨胀期间需要更多的水分。排水。盆栽植物还应注意排水，特别是在雨季或大雨后的雨季，要注意遮雨或控制水量。产量高，没有年限，病虫害少，栽培管理容易。无花果是在种苗的那一年种的，如果管理得当，每亩的产量为2公斤和500公斤。