

# 引进华光板栗苗、九家种板栗苗发源地

产品名称	引进华光板栗苗、九家种板栗苗发源地
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	1.50/棵
规格参数	规格:嫁接成品树苗 地径:1厘米 产地:山东
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

## 产品详情

引进华光板栗苗、九家种板栗苗发源地，购买板栗苗，就到山东锦瑞苗木，是您放心省力的选择。我苗木合作社具有较强的货源组织和回程车调配能力，确保客户在最短的时间内办齐所需苗木，并办检疫，免费接送。泰安锦瑞苗木竭诚结交了全国各地不同的新老客户，我希望您对我放心。

板栗树苗部分讲解：板栗树苗注意防治病虫害：板栗的主要虫害有：栗瘿蜂、天牛、象鼻虫、蚜虫等，主要病虫有：干枯病（又名板栗疫病）、膏药病等。发现上述病虫害要及时进行防治。从外地引进种子，苗木或穗条时，要严格检疫，不要把本地没有的病虫带进来。另外，如在苗圃发现病虫害时要进行防治后再出圃栽植，以免将病虫害带入造林地，增加防治难度。

板栗嫁接苗的培育与管理：当嫁接苗长达15cm左右时，除注意保持棚内圃地湿润外，还要注意通风透光，揭棚练苗，并适时抹除前蘖（一般3 - 5次），避免荫蘖与接穗争夺养份，影响嫁接成活率和成活后的苗木生长。为了使嫁接苗多分枝、早成型，当苗高达60 - 80cm时摘心，保持设计的定干高度。芽苗砧育苗在施肥、除草、松土、灌溉等措施上与常规育苗相同。

九山1号板栗品种树势中庸，树姿较开张。可采用低干矮冠自然开心形、主干疏层延迟开心形为主。修剪要控制结果部位外移过快，改善内膛枝的光照和营养，实现立体结果。修剪上应采用轻剪和充分运用夏季修剪技术，培养背上枝组，减缓结果部位外移。进入盛果期后，冬剪时要加强枝组和结果枝的培养及更新。板栗树开花和授粉有什么特点：板栗为雌雄同株异花果树，花序为柔荑花序，雄花较雌花多。栗树自花授粉不结实。栗树实生苗达到开花结果一般需要5~8年，但在苗圃中也不乏2~3年就开花结果的，极个别单株甚至当年就能开花结果。板栗雄花开花过程大致可分为花丝顶出、花丝伸直、花药裂开和花丝枯萎4个阶段。整个开花过程10天左右。在一个雄花序上总是基部的雄花先开，逐渐向上延伸，先后相差约7天。带有雌花的花穗比单雄花花穗的花期晚5天左右。

板栗树苗部分管理资料：板栗树冬季修剪：修剪是促进板栗持续高产优质的重要措施之一。板栗的冬季修剪应在板栗落叶后至翌春发芽前为修剪的最佳时期，在修剪过程中，要将病虫枝全部剪掉并集中烧毁

，以减少病虫害源。板栗幼树的冬剪：板栗极喜光，3年生以下的幼树修剪要求以培植低干、中冠、少主干、多母枝的自然圆头形或自然开心形的树体结构，冬剪时对选留的骨干枝延长枝进行适当短截，疏去内膛的过密枝、细纤枝、重叠枝、交叉枝，选留好结果枝，调节好各结果枝组间的距离和方向，培育好主枝；对骨干枝的延长枝，实行一年缓放，二年短截的修剪方法。燕龙板栗品种适宜在河北、山东、河南等板栗主产区发展，密植栽培。平坦肥沃地适宜株行距为2~3米x3~米米，山地、瘠薄地株行距为1.5~2米X2~3米；结果数年后可隔行移栽或间伐。嫁接后当新梢长到20厘米时摘心1次，增加侧枝数最。嫁接后第2年在3~4月份发芽前拉枝，避免重叠枝、交叉枝出现，疏除多余枝；于枝条背上每隔20~25厘米用钢锯条在饱满芽前3~5毫米处刻伤，以促发中庸壮枝，当年结果。

引进华光板栗苗、九家种板栗苗发源地板栗树的结果枝：板栗树能生长果实的枝条称为结果枝。一般多由上年生枝条上部的完全混合花芽发育而成。落叶后大部分又变成了下年的结果母枝。结果枝从下到上可分4段：基部数节叶腋中为叶芽；中部3~8节叶腋中是雄花芽；上部2~3节叶腋中生长有雌花簇(也称雌花序)的雄花序；顶端1~3节叶腋中是混合花芽。镇安1号板栗品种适宜种植条件：镇安板栗产区，属暖温带湿润季风气候区，年日照1947小时，年平均温度12.3℃，7月份平均温度23.4℃，1月份平均气温0.5℃，极端最高温度37.4℃，极端最低温度-12.6℃，10℃的积温3774℃，全年无霜期214天，年均降雨量804.4毫米，雨季集中在7~9月份，土壤PH6.26，土壤肥力一般。