

# 金傲芬无花果苗、金傲芬无花果苗如何修剪

产品名称	金傲芬无花果苗、金傲芬无花果苗如何修剪
公司名称	泰安开发区泽雨苗圃
价格	4.00/棵
规格参数	泰安泽雨苗圃:1 齐全:1-4 山东:泰安
公司地址	泰安市岱岳区北集坡街道道洼村
联系电话	13371002320

## 产品详情

山东泽雨本公司培育名、优、特果树新品种100余种，年生产各种优质嫁接种苗上亿株。苗木数量大、品种全、价格优。产品远销华北、东北、华中、华南等地。我们本着"诚信至上、质量至上、服务至上"的经营态度，获得了所有客户的一致认可，让客户高兴而来，满意而归!

所产无花果苗等果树苗常年销往广州、贵州、云南、广西、四川、重庆、湖北、湖南、甘肃、宁夏、内蒙、新疆、西藏、河北、河南、山西、陕西、辽宁等地。欢迎广大新老客户来电垂询!据嘉兴检验检疫部门统计，第7年开始，这些七叶树陆续有10厘米胸径的苗木出现，每年供不应求，第7年至第9年每年销售额都在50万元以上。花卉产业也直接带动了农民收，今年48岁的大有乡长山渠村村民席永娥每天准时和来到昌盛源合作社玫瑰花基地的大棚，和同伴们一起忙碌着采摘玫瑰，修剪、包装。

季节性比较强的地被苗木首当其冲，特别是产量较大的红花檵木小袋苗市场反应平淡。

记者在这家园林公司看到，无花果苗批发：青皮无花果苗、布兰瑞克无花果苗、紫陶芬无花果苗、早黄无花果苗、金奥芬无花果苗、波姬红无花果苗；培育无花果树品种介绍—1青皮无花果树：树势旺盛，主干明显。叶掌状3—5浅裂。果实扁，倒圆锥形。果实成熟前绿色，熟后黄绿色、果肉紫红色，果目小，开张。夏果平均单果重80—100克，秋果平均单果重40—50克。果面平滑不开裂，果皮韧度较大，成熟果含糖量在20%左右，品质极佳，丰产、较抗寒、属晚熟品种。

2、布兰瑞克无花果树：树势中庸，主干不明显，多丛生；叶掌状5—7深裂，裂片窄条形。果实熟前黄绿色，熟后黄褐色，果肉琥珀色到淡粉红色。果形不整，长卵圆形斜偏一方，果目开张，果皮薄，不开裂。夏果平均单果重100—120克，数量极少，秋果单果重30—40克，极丰产。成熟果含糖量达18—20%，品质上佳，中晚熟品种。3、紫陶芬无花果树主要利用夏果的早熟种。树势中强，树姿半开张。叶为心脏形，5裂。叶色绿，叶背茸毛稍多。夏果大，短卵圆形，重110~150克，较大果重252克。果面紫色，果肉桃红色，肉质厚，柔软致密，味甜，有香味，品质较好。6月下旬至7月上旬成熟，丰产。也可采收秋果，球形或扁球形，品质优。扦插苗当年见果。需要授粉。适合设施栽培。

## 二、无花果树苗栽培技术

无花果的主要栽培技术包括建园定植、土肥水管理、修剪和幼树越冬保护等内容。1、建园和定植无花

果栽培的纬度限制是北纬40°以南，冬季气温低于—15 的地区不宜建园。建园宜选择背风向阳的地方，忌涝洼地。建园前深翻整地，亩施土杂肥2000—3000公斤。建园时应选良种壮苗，深坑浅栽，栽植时间以3月底至4月初为佳，胶东地区可延长4月中旬。栽植密度青皮无花果一般株距3—4米，行距4—5米；布兰瑞克无花果株距25—3米，行距4米。

2、土肥水管理土壤管理可参照一般果园进行。基肥可选用厩肥、土杂肥和复合肥，而以鸡粪最好。施用时间是早春和秋后。追肥种类，生长早期主要施用磷酸二铵，忌用碳酸氢铵和尿素；生长后期宜施磷酸二氢钾。相对来说，无花果较抗旱不耐涝，春季和越冬前注意灌水，生长季节应做好防涝排水工作。3、修剪无花果树形培养适宜采用多主干自然开心形。栽植第一年定干，定干高度40—60厘米。第二年枝条留30—40厘米进行短截，增加分枝能力，控制树高，保留4—7个主枝。以后每年夏季对50厘米以上长枝进行摘心，控制旺长，或喷施矮化剂。同时疏除根蘖枝、过密枝和细弱枝。4、幼树越冬保护栽植当年，无花果幼树抗寒能力差，枝条抽干较重，应采取保护措施。简便易行的方法是主干基部培土20—30厘米，枝条绑扎稻草绳。有些地区仍旧处于高温天气，所以本应的迷你玫瑰，走货并不如人意，虽然相比平时有一点量，但气候还是决定性因素。按照往年的惯例，每年的春节竞螻际腔 芟售的旺季。盆器价格、基质成辍 斯し延枚荚谩牵花卉的价格肯定也得涨。高温不仅仅只击倒了鲜花生意，紧接着便是结婚和乔迁新居的旺季，