

罗亚明罗亚理樱桃苗 需冷量低南方种植樱桃品种

产品名称	罗亚明罗亚理樱桃苗 需冷量低南方种植樱桃品种
公司名称	泰安市泽农苗木有限公司
价格	15.00/棵
规格参数	类型:嫁接苗 成活率:95% 地径:1公分
公司地址	山东省泰安高新区龙泉社区
联系电话	15725486052

产品详情

罗亚明樱桃树苗低温需冷量为200-300小时。早熟品种，果实中等大，约9-10克，红皮红肉，风味好，可溶性固形物18%，果肉硬度高，耐储运，果实成熟后在树上10天仍然保持相当好的硬度。成熟期和舍蓝相近，比宾库早11-14天，丰产性好。自交不亲和，罗亚理作为授粉树。树势中等，较不耐干旱，裂果程度轻。罗亚理樱桃树苗为极早熟短低温甜樱桃品种，该品种果实大，椭圆形，单果重约10克，红皮红肉，风味极好，可溶性固形物18%，果肉硬度极高，耐储运，果实成熟后在树上14天仍然可以保持相当高的硬度。丰产性极好。自交不亲和，罗亚明作为授粉树。树势直立，适应性好，抗裂果。一般认为该品种低温需冷量为300-400小时。如何提高樱桃苗的种植成活率：1.根系修剪:将下层的垂直粗根完全剪除，只留上层的毛细根，将上层根剪得基本整齐即可。若下层垂直根不剪，将来树体不旺。2.栽植深度:将根系埋入土中约5cm即可，樱桃是浅根性果树，栽植深了，影响根颈部呼吸，根颈部易发生病害。3.定干:一定要定干在饱满芽处，若定干在弱芽处，则发芽较晚或引起苗木死亡。4.浇水:浇水应注意两点，一是栽植1年生苗木约浇1水勺（约3斤）水即可，不必水盆过大，浇水过多，若水盆过大浇水过多易使地温降低，延迟发芽。二是第二次浇水应在第一次浇水15-20天后进行，尽可能在20天后进行，若芽子没有萌发而频繁浇水，能阻碍根系呼吸，迟迟不发芽或引起苗木死亡。