

蜂糖李子树苗种植基地，蜂糖李子树苗多少钱一棵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 蜂糖李子树苗种植基地，蜂糖李子树苗多少钱一棵 |
| 公司名称 | 泰安开发区荣刚园艺场 |
| 价格 | 5.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所） |
| 联系电话 | 05388912256 15853887025 |

产品详情

蜂糖李子树苗种植基地，蜂糖李子树苗多少钱一棵

蜂糖李的成熟时间通常是在每一年的端午节过后15天以后就开始逐渐成熟，它的果实口感比较可口，并且果肉含有很多的水分，吃起来十分的爽口。它的姿态大小就像是一个乒乓球一样大小，表面的皮也很薄，也很容易剥落下来。

秋季是李树恢复树势、树体积累营养的重要时期。应用科学的管理措施，可增加树体营养的贮备，促进花芽进一步分化，为翌年丰产、优质打下良好基础。经多年实践，凡此期管理技术应用得当的李园，翌年均能丰产、优质。现将李园秋季管理技术总结如下。一、肥水管理1、叶面喷肥：果实采收后尽早喷1次0.3-0.5%磷酸二氢钾，以提高树体的养分积累，促进叶片同化作用和枝条充实，增强树势，以利越冬。2、施基肥：8月下旬-10月初施入基肥。施肥量，初果期每株施入腐熟农家肥20-30千克；盛果期每株施入30-50千克，同时配以尿素0.5-1.0千克，复合肥（氮 磷 钾 = 15 12 15）1.5千克。采用放射状沟施的方法施入，在树盘1/2处为起点，外端与树冠外缘相齐，挖7-9条放射状沟，深30-40厘米，宽40厘米左右，将混合好的肥料撒入沟内，然后覆一层土。此期施肥根系正值生长高峰，断根容易愈合生长，肥料腐烂分解时间充分，矿化程度高，部分肥料可当年被树体吸收利用，促进叶片同化作用，以利于制造和积累营养，满足李树翌年萌芽、开花、坐果和生长需要。3、灌水：采果后及时灌第1水，灌水量视土壤墒情而定，以使土壤湿度最有利于李树生长发育为宜。灌水时在李园行间开深20~25厘米的沟，沟向与水道最好垂直，灌水后及时将沟填平。以后视土壤墒情确定是否灌水；在土壤封冰前灌1次透水，以增强叶片光合作用，促进树体营养积累，利于树体越冬。二、土壤耕翻一般在9月初-10月初结合秋施基肥进行土壤耕翻，耕深20-40厘米。此期地上部植株生长缓慢，同化产物消耗较少，并已开始回流积累。所以此期耕翻土壤正值李树根系第2或第3次生长高峰，伤口容易愈合；同时易生新根，有利于吸收和合成营养物质，增加树体积累，有利于翌年的生长发育。另外此期耕翻后经过漫长的冬季，有利于土壤风化，提高土壤通透性。还可消灭地下害虫，铲除宿根性杂草和根蘖。三、树体管理1、清树：摘净残留在树上的病、虫果，集中深埋；清除根茎部萌发的根蘖。2、清团：清除地上杂草及枯枝落叶，并将其清理出园或集中烧毁，以减少越冬病、虫源基数。四、整形修剪果实采收后结合清树进行摘心疏枝。要注意选

留位置适宜的强壮枝，疏除细弱、病虫、密生、下垂及内膛过密处徒长枝，并对预留枝进行摘心。改善树体通风透光条件，以利枝条充实、树体越冬，同时也为冬剪打好基础。五、病虫害防治为保护叶片，同时为减少病源、降低害虫越冬基数，在秋季树上可喷50%的多菌灵800-1000倍液，或甲基托布津800-1000倍液，或80%的代森锰锌800-1000倍液，或50%退菌特800倍液；防治山楂红蜘蛛，可用40%的三氯杀螨醇乳油1500-2000倍液；防治李小食心虫等可用2.5%的敌杀死3000倍液，或50%的辛硫磷800倍液+40%的氧化乐果800倍液，或20%的杀灭菊酯3000倍液。六、越冬保护在土壤封冻前树干涂白（在栋白剂中加入适量的杀菌剂），以保护树体安全越冬。