

喀什三黄鸡苗 哈密芦花鸡苗批发 阿克苏大种黑鸡苗价格 和田麻鸡苗供应

产品名称	喀什三黄鸡苗 哈密芦花鸡苗批发 阿克苏大种黑鸡苗价格 和田麻鸡苗供应
公司名称	成都亿鑫和进出口贸易有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:5.3 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安街道五会村3组37号 (注册地址)
联系电话	17369032651 17721957263

产品详情

三黄鸡1-2日龄所需温度为32-34℃，此后每过一周环境温度可下降3℃，到5周龄后环境温度以20-21℃为宜，不得少于16℃。在育雏期，鸡舍内温度每天可上下波动1-2℃，造成适当的温差，可以刺激食欲，提高采食量，促进鸡的生长。

育雏周，鸡舍内保持56-70%的稍高湿度，防止雏鸡脱水，影响健康和生长;两周后鸡舍内湿度控制在55-60%。通过加强通风，避免饮水器漏水，防止垫料潮湿等措施，保持舍内的干燥。

要注意鸡舍的通风换气，及时排除鸡舍内污浊空气，鸡舍内氨气量不应超过20ppm，也就是以人闻了不感到刺鼻为标准。要解决通风换气和保温这一对矛盾，通常1-2周龄时以保温为主，适当注意通风，必须防止冷空气直接吹到雏鸡身上。3周龄开始要逐渐增加通风量和通风时间，5周龄后应以通风为主。

4、适当的光照

饲养三黄鸡需要适当的光照，其目的是延长采食时间，增加摄食量，加快生长速度。通常1-2日龄用24小时光照，3日龄后每天光照23小时，夜间关1小时保持黑暗，使鸡能适应突然停电时的环境变化，防止引起鸡群堆集死亡。光的亮度在育雏期的周要强一些，每平方米地面2-3W，第二周后的每平方米0.75W，防止过分活动或发生啄癖。有条件的也可采用1-2小时光照，2-3小时黑暗的光照方式。并且需要注意观察鸡的行为精神、采食、粪便、呼吸等状态，发现有异常情况时、要查明原因，及时采取措施。

5、适当的密度

要保证每只三黄鸡在不同生长阶段都占有必要的地面面积，使其自始至终保持适宜的密度，这是三黄鸡饲养成败的一个关键。"饲养密度"这一概念包含着三个方面的内容:一是每平方米面积养多少羽鸡;二是每羽鸡占有多少食槽位置;三是每羽鸡有多少饮水位置。这三个方面缺一不可。

三黄鸡的饲养密度通常以出售时的每平方米载鸡数来计算。采用地面厚垫料平养方式时饲养密度为每平方米11-14羽，采用网上平养方式时饲养密度为每平方米14-16羽。