

## 红杏树苗种植资料，红杏树苗根系发达

产品名称	红杏树苗种植资料，红杏树苗根系发达
公司名称	泰安市广祥农业科技有限公司
价格	.00/棵
规格参数	型号:嫁接苗 品牌:广祥农业 产地:山东泰安
公司地址	山东泰安高新区北集坡镇
联系电话	0538-8912686 13954886187

## 产品详情

泰安开发区广祥农业位于泰安市南部开发区，下设基地5处，面积500余亩，是国家林业局命名的“特色育苗基地”，有10多年生产历史。主要品种有：桃树苗、苹果苗、梨树苗、杏树苗、香椿苗、柿子苗、核桃苗、樱桃苗、山楂苗等众多果树苗，产品远销北京、上海、辽宁、天津、江苏、河南、河北、陕西、新疆、西藏拉萨等二十几个省市。该基地坚持“规模经营、科技兴圃、信誉第一”的原则，赢得了客户的信赖和好评，并且受到市场的一致认可，先后获得“山东省科技示范园”、“泰安市十佳苗圃”等荣誉称号。

### 红杏树苗种植资料，红杏树苗根系发达

杏树苗定植后浇水、覆膜并随即定干，干高40厘米~50厘米。二、大棚杏树容易出现哪些病虫害侵袭?1、杏褐腐病主要危害果实，也侵染花和叶片，果实从幼果到成熟期均可感病。发病初期果面出现褐色圆形病斑稍凹陷，病斑扩展迅速，变软腐烂。后期病斑表面产生黄褐色绒状颗粒，呈轮纹状排列，即为病菌的分生孢子梗和分生孢子，病果多早期脱落。2、杏疮痂病主要危害果实和新梢，幼果发病快而重，染病果多在肩部产生淡褐色圆形斑点，直径2-3毫米，病斑后期变为紫褐色，表皮木栓化，发病严重时常多个小病斑连成一片，但深入果肉较浅。新梢上的病斑褐色，椭圆形，稍隆起，常发生流胶。3、杏细菌性穿孔病主要危害叶片，也危害果实和新梢。叶片受害后，病斑初期为水渍状小点，以后扩大成圆形或不规则形病斑，直径约2毫米，周围似水渍状，略带黄绿色晕环，空气湿润时，病健组织交界处发生一圈裂纹，病死组织干枯脱落，形成穿孔。

杏树苗品种特征特性树势健壮，树冠半开张，干性强。多年生枝阳面红褐色。叶片浓绿色，卵圆形，叶尖渐尖，长7.5~9.0厘米，宽4.5~6.2厘米。成花能力强，平均每芽3~5朵花，多7朵。幼树雌蕊败育花比率在60%左右，成龄树40%左右。果实近圆形，果顶平，缝合线明显，果面光洁被红色，底色浅黄。平均单果质量48克，大68克，纵径4.8~5.2厘米，横径4.1~5.0厘米，香味浓，风味佳，含可溶性固形物14.4%，品质上等，离核，仁甜。早果性强，幼树定植或高接第2年就能开花结果。1年生萌芽率及成枝力均高，2年生成枝力明显下降，极易形成短果枝，3年生以上树以短果枝为主，长、中、短果枝均坐果良好。在山东省泰安地区，3月中旬开始萌动，3月下旬开花，花期5~7天。

杏树苗栽培技术要点适宜山东地区栽培。可在中国华北、西北及东北部分杏产区推广。树形采用小冠疏层形，幼树修剪以短截为主，以促进分枝扩大树冠，初果期在保持好树形的基础上，不断扩大树冠，尽可能多的培养结果枝组，以冬剪和夏剪相结合为好。基肥以有机肥为主，在10月中旬施入。施后充分灌水，萌芽前和硬核期是灌水关键时期，萌芽期以渗土下50厘米为宜，硬核期以渗土下40厘米为宜。自花结实，单一品种园也可连年丰产，但为提高品质，建议与‘凯特’、‘金太阳’等品种混栽。坐果率高，应注重疏果，花后15~20天定果，长枝留4~5个果，中枝留2~3个果，短枝留1个果。