

盐酸多西环素可溶性粉 加富门

产品名称	盐酸多西环素可溶性粉 加富门
公司名称	玉林市安安动物保健有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:加富门 对象:兽药 规格:100克：5克
公司地址	中国广西 玉林市 西聚路18号，东方世纪大酒店直下50米左转即到（玉林市兽医站大院内）。
联系电话	086 0775 2098323 15207851416

产品详情

品牌	加富门	对象	兽药
规格	100克：5克	剂型	粉剂
使用方式	内服	适应症	用于革兰氏阳性菌和阴性菌感染，也可以用于支原体、立克次体等感染。
有效期	24（月）		

【通用名】盐酸多西环素

【主要成分】盐酸多西环素

【性状】本品为淡黄色或黄色结晶性粉末。

【不良反应】按推荐剂量使用，未见不良反应。

【休药期】28日。

【规格】100克：5克

【包装规格】100克：5克

【贮藏】密封，遮光，置干燥，阴凉处保存。

【有效期】二年。

【药理作用】（1）药效学 抗菌谱与其它四环素类相似，体外和体内抗菌活性均较土霉素、四环素强。

细菌对本品与土霉素、四环素等存在交叉耐药性。主要用于治疗畜禽的支原体病、大肠杆菌病、沙门氏病、巴氏杆菌病和鹦鹉热等。

(2) 药动学 内服吸收迅速，受食物影响较小，生物利用度高，与牛奶替代品同时内服，在犊牛的生物利用度为70%。有效血药浓度维持时间长，对组织渗透力强，分布广泛，易进入细胞内。在犬的稳态表现分布容积约为1.5l/kg。蛋白结合率高，牛和猪为93%。部分在肠内以螯合的形式灭活。肾排泄仅为25%，胆汁排泄少于5%。犊牛内服的半衰期为20小时。

【适应症】用于革兰氏阳性菌和阴性菌感染，也可以用于支原体、立克次体等感染。

【用法用量】混饮 每1升水 猪25~50毫克（以多西环素计）禽
300毫克（以多西环素计）连用3~5日（具体使用方法请参照使用手册）

【注意事项】成年反刍兽马属动物和兔不宜内服；避免与乳制品和含钙量较高的饲料同时服用。