

立信菌王，食药菌专用复合微生物菌

产品名称	立信菌王，食药菌专用复合微生物菌
公司名称	济宁高新区科信生物开发制品厂
价格	.00/个
规格参数	主要成分:复合微生物菌 含量 :200亿/千克(%) 适用范围:食用菌
公司地址	中国 山东 济宁市 山东省济宁市高新技术开发区火炬工业园
联系电话	86-0537-2366198、2366192

产品详情

主要成分	复合微生物菌	含量	200亿/千克(%)
适用范围	食用菌	外观	液体

食(药)用菌专用立信菌王药肥兼备的复合微生物制剂

有机食(药)用菌的必备产品

一、产品简介

本厂推出的“立信菌王”是二十一世纪高科技产品，是一种无公害、无污染、无残留的复合微生物制剂。具有灭杂菌、抗病、增产之功能，含有90多种有益微生物和食用菌所需的多种促长因子、活性酶、氨基酸等成份。其作用机理是让有益菌“吃”有害菌，起到“以菌制菌”的目的，在拌料中，完全可以替代其它灭菌药。适用于平菇、双孢菇、鸡腿菇、草菇、金针菇、灵芝、木耳、灰树花猴头菇、滑菇、姬菇、茶薪菇、杏鲍菇、金福菇、姬松茸等各种食(药)用菌。尤其在食用菌生产老区使用，抗病、增产效果更明显。

二、使用效果

- 1、抗病强：对发菌过程中的绿霉、曲、毛霉等杂菌污染和菇体萎缩、水肿、发黄、硬开伞、畸形等子实体真菌病害有很好的防治作用；对剧烈环境条件变化如：冻害、药害等有明显的缓冲作用。
- 2、增产明显：菇形端正、色泽光滑、肉质厚实，菌柄、菌盖明显增大，产量提高20-65%，增强耐贮存耐运性、商品性好、货架期长。
- 3、出菇率高：加快菌种萌发、吃料速度快，促进菌丝健壮生长、降低污染率，出菇率高达95%以上。

4、出菇提前：可提前3-15天出菇。转潮快、潮次分明。

5、绿色有机：本产品为绿环保型纯生物制剂，使用后无化学残留，无任何副作用，是有机食用菌生产基地的必备产品。

三、使用方法

菌种表面处理：食用菌装袋接种前，将菌种掰成小块，用喷雾器（注：打过农药要刷开净）向种子表面均匀喷施本品、地下水1：200比例的稀释液，做种子表面处理，处理后采用常规播种即可。此方法可加快菌种萌发，促进菌丝健壮生长。

1、拌料

发酵料栽培时：先用水和加入1%石灰拌匀后，堆制发酵。温度达60℃以上后，翻堆2-3次，再过24-40小时即可拆堆降温至30-35℃准备接种。按1000斤干料用本品250毫升的用量，加上与本品相等的红糖250克（白糖也可，红糖效果最佳，先用温水溶化）兑入适量（10-15公斤）地下水稀释后，边喷匀边拌料，翻拌均匀后，即可装袋接种（注：使用本品完全可替代其它杀菌药）。

生料栽培时

方法一：用地下水和加入1%石灰时翻拌均匀后，每1000斤干料用本品250毫升、红糖250克（白糖也可，红糖效果最佳，先用温水溶化），兑地下水10-15公斤，喷施或泼浇拌匀，即可装袋接种。若用河水时，每500公斤河水加入高锰酸钾40-50克后与1%石灰一起翻拌均匀，每1000斤干料本品250毫升、红糖250克（白糖也可，红糖效果最佳，先用温水溶化），兑地下水10-15公斤，喷施或泼浇拌匀，即可装袋接种。若用自来水，需静置24小时后，每1000斤干料用本品250毫升、红糖250克（白糖也可，红糖最佳，先用温水溶化），兑地下水10-15公斤，喷施或泼浇拌匀，即可装袋接种（注：使用本品完全可替代其它杀菌药）。

方法二：用地下水和加1%石灰时，搅拌均匀后，（若用河水时，每500公斤河水加入高锰酸钾40-50克后与1%石灰一起搅拌均匀备用）按每1000斤干料用本品250毫升、红糖250克（白糖也可，红糖效果最佳，先用温水溶化），兑入适量（视料干湿度兑水100-350斤）地下水稀释后，向培养料上喷匀，以手握成团，一触即散为适中（注：千万不要过湿）进行堆积、踩实（料堆越大越好），用塑料薄膜将料堆密封发酵7-15天即可，料中有酒曲味，即烦恼功。（此方法发酵，不会产生高温，可以彻底灭菌）撒堆后，调节培养料含水量60%左右，即可装袋种。（注：使用本品完全可替代其它杀菌药）。

2、喷施：

在菌袋出菇前或菌床覆土后将本品、地下水按1：300的比例稀释混匀，每天向菌袋或菌床表面喷施，可促进菌丝上土和提前出菇。

子实体发育阶段，将本品、地下水按1：300的比例稀释混匀，向子实体表面喷施，每潮菇喷施2-3次即可，可使菇体明显增重并质优（注：草菇在子实体表面能够喷水时，再兑入本品进行喷施）。

每采摘一潮菇后，马上喷施本品、地下水1：300的稀释液，可促进子实体提前再次上土，尤其在出菇2

3-潮后使用，增产效果更加明显，提出菇后劲，改善品质，增强抗病能力。

菇棚消毒，将本品按1：300的比例用水稀释后，用喷雾后（注：打过农药要刷干净）向菇棚表面及空中进全面雾状喷施，每5天喷施一次，可防止杂菌污染菇棚。

3、注射

当袋栽食用菌袋内缺水时，将本品、地下水按1：300的比例稀释后，均匀注射到袋内（注：使用专用注射器），可防止缺水或杂菌污染。注射完毕后，用本品原液涂抹在注射眼上，将注射眼密封信，以免外界杂菌侵入。

当袋栽食用菌局部杂菌污染严重时，将本品原液直接向袋内局部杂菌污染处均匀注射，能够抑制杂菌生长，消除杂菌污染。注射完毕后，用本品原液涂抹在注射眼上，将注射眼密封信，以免外界杂菌侵入。

以上使用方法，结合使用（尤其拌料、喷施相结合）效果最佳。

四、注意事项

- 1、本品酸性，pH值 3.5，底部浑浊及上部附有白色均属正常，用前摇匀，用后盖紧瓶盖，常温避光保存。
- 2、用时（拌料等）切勿将本品置于50 以上的环境。
- 3、勿与其它杀菌剂（如多菌灵、克霉灵、得克斯消毒散、高锰酸钾、漂白粉、甲醛、硫酸铜、甲基托布津等）混合使用。如无地下水，用河水时，先加入高锰酸钾消毒后，每15公斤水加入一两白糖或用0.5公斤棉籽壳，使红色消失，即可使用。如用含氯自来水时，先将含氯气自来水静置24小时以上使用。
- 4、在使用喷雾器时一定要将喷雾器洗涮干净。
- 5、本品保质期18个月，如有腐臭味，请停止使用。

厂址：山东省济宁市高新技术开发区火炬工业园