

西梅李子苗大量供应 优质西梅李子苗尽在龙烁苗木

产品名称	西梅李子苗大量供应 优质西梅李子苗尽在龙烁苗木
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

欢迎光临龙烁苗木种植经销合作社，由于市场价格变动，具体价格以电话咨询为准！

李子树苗想丰产怎么做一、适地适树。李子苗为蔷薇科李属植物。日本李产区与我国南方气候似，可选用日本优良品种，如脆红，单果重100克，外观漂亮，紫红色，8月下旬成熟，品质，离核，味甜。

二、改土建园。应遵守以下原则。

（一）园地选择。应选择光照充足，土壤深厚，土质疏松，水源充足，排水通畅的中性至微酸性沙壤土建园。地形选用梯台或缓坡，馒头山最好。

（二）、栽植时间。从落叶至发芽前均可栽植，南方的果农有“秋季先发根据，春栽先发芽的经验。因为秋季李树虽已落叶，但地温高，定植后根系能在当年愈合并发新根，有利于翌年及时萌芽生长。

（三）、栽植密度。株距2?2点5米，行距3?4米，亩栽70株左右。

(四) 定植方法。定植穴宽1米，深0.8米。定植穴挖好后，将穴内泥土淘出，填下熟土（即一层泥土，一层秸秆和杂肥，10千克杂草与1千克磷肥混合成杂肥），然后将原有泥土回填至地平，选用合格嫁接苗摆放在穴的中心，使根须伸展，垒上细土，用脚踩紧后，理成窝盘，灌足定根水。

(五) 窝盘覆盖。用杂草覆盖窝盘1厘米，以保持土壤湿度。

三、稳果。花谢掉3/4时，用0.2%硼砂加0.002%赤霉素（先用酒精溶化）加0.002%4D乳剂好。花谢后20天是生理落果高峰期，按上述配方喷第二次，可减少落果。也可在花谢3/4时用0.5%尿素溶液液或用3%草木灰和2%大炮酸钙浸出液（各浸1天后过滤混合）加防落素0.001%?0.003%混合喷洒，对减少落花落果也有较好效果，在花芽分化临界期，喷洒0.2%?0.3%B溶液，促进花芽分化。

四、科学施肥。科学施肥能使树木体发育良好。防止“大小年”结果，提高产量，增时果实品质，延长结果年龄，增强树体对不良环境和病虫害的抵抗力。李树进入结果期后一般年施3?4次肥。7?8月在树冠滴水线处挖一环状沟，深40厘米，宽50厘米，施一次恢复树势肥；果农称为“养树肥”基肥以秋施为主，株施农家肥25千克，土杂肥50千克，以供翌年早春萌芽、开花、燕尾服叶之养分需要；10月至翌年1月落叶至萌芽前，株施农家肥25千克，土杂肥50千克，以提高树体营养水平；早其2月花芽萌动至花前施花前肥，在树冠滴水线处挖一环状沟，深40厘米，宽50厘米，株施尿素0.25千克加农家肥25千克；以促进果实膨大。除子地下施肥外，还应补施叶面肥1?2次，在果实硬核期和膨大期分别用0.4%尿素加0.3%磷酸二氢钾混合喷洒一次，在清晨露水干后或下午时以后喷洒最好。

李子苗管理需要做的工作非常少，这个时间农户是比较清闲的，冬季上冻李子苗都处于休眠状态，所以冬季管理更省心，冬季过后，春天来临，春天的管理方式功夫定要下足才可以哦。李子苗枝梢生长迅速，果实发育期短，因此施肥要及时、合理。春季施肥主要是指萌芽前的施肥，施肥时间不宜超过2月下旬，提前早施更好。肥料种类为化学碳铵、磷肥、钾肥与有机肥配合。株产35~50公斤果实的李子树，单株施优质腐熟人畜粪40公斤，尿素0.25公斤，过磷酸钙0.15公斤，氯化钾0.4公斤。李子苗如何避免冻害霜害和冻害是指果树在生长期夜晚土壤和植株表面温度短时间降至0oC或0oC以下或者遇到霜降，致使果树幼嫩部分遭受伤害的现象。

李子苗生理落果有3个时期：第一期于谢花后发生，主要由雌蕊和花粉发育不完全、授粉不良所致；第二期在幼果期，主要是树体营养供应不良而致；第三期是硬核期发生，主要由新梢与果实争夺养分、水分所致。也要注意病虫害危害等因素。

在树冠下面，靠近根系分布区，挖2~3个施肥坑，将有机肥与氮、磷、钾化肥充分混匀后施入，施后及时盖土。萌芽前遇干旱和多雨，应灌施清淡粪水抗旱和排水防渍。预防生理落果。生理落果是李子树生长上存在的重要问题，在多雨条件下表现尤为突出

李子苗的三早栽培技术措施一、合理修建促进早期花芽形成：李定植当年，新梢长到30厘米左右时进行摘心控制，促发副梢并形成花芽。如在密生李、大石中生、大石早生上通过摘心后，有40%的副梢能形花芽，而夏季不在心的李树，当年一般不形成花芽。第一年冬剪时，对当年生枝一般缓放不剪，对于密挤枝，徒长枝、遮光枝采用疏出的办法处理。这样，在当年缓枝上则能形成大量从状花芽。第三年冬剪时，对缓放过的枝进行适当回缩，避免树枝衰弱。以后各年冬剪时，则依次采用缓琐事修剪。

二、合理施肥促进花芽分化和果实早熟着色：施肥要注意各种肥料的配合，特别注意在秋季落叶前施足有积肥。第二年李果成熟前要施用适量的磷、钾肥。以促进花芽分化和果实着色。氮肥对李果的成熟早晚有较大影响，因此，在李果采收前要控制氮肥的施用量。这样，可以提前李果的成熟期从而提高其商品价值。

三、防止春季低温提高座果率：李在花期常受低温伤害而影响座果。为此，可在春季芽萌动前灌水，以降低地温，延缓萌芽，推迟花期。夏季修剪多摘心、短截、促发副梢，利用副梢比主梢花期7至10天的特性来延迟开花。秋季9月中、下旬每株可喷布100毫克乙烯利，也可延迟翌年花期3至5天。利用以上措施，避免早春低温对花的为害，从而提高座果率。

李子苗常见的栽培技术清树摘净并残留在树上的病果、虫果、僵果，然后收集在一起挖坑深埋。剪去树上的干枯枝、病虫枝、根部萌发的根蘖并带出园外深埋或烧掉。

叶面施肥果实采收后应尽早喷施1次0.2%~0.3%的磷酸二氢钾溶液，以增强树势，有利于树体营养的积累和越冬。此时叶面应少施或不施尿素。

龙烁苗木种植经销合作社大量供应果树、绿化苗木，诚信经营，欢迎咨询！