

美国防止儿童打开包装ASTM-D3475测试费用

产品名称	美国防止儿童打开包装ASTM-D3475测试费用
公司名称	深圳市莫尼卡产品检测认证技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石科技园AB栋
联系电话	0755-23345400 13332906252

产品详情

美国防止儿童打开包装ASTM-D3475测试费用？

试剂瓶防儿童打开ASTM-D3475测试，保健品瓶盖防儿童打开ASTM-D3475测试，泡腾片盖防止儿童打开ASTM-D3475测试，医疗包装瓶防儿童打开ASTM-D3475测试，组合瓶盖ASTM-D3475测试，OPC瓶防儿童打开ASTM-D3475测试，OCOP瓶防儿童打开ASTM-D3475测试，口服液聚酯瓶ASTM-D3475测试，儿童安全包装盒ASTM-D3475测试，安全药瓶ASTM-D3475测试，可二次盖紧防儿童打开安全盖ASTM-D3475认证，儿童包装袋ASTM-D3475认证，具有防儿童开启功能安全盖ASTM-D3475测试，防潮组合瓶盖ASTM-D3475测试，儿童防打开安全盖ASTM-D3475测试，防止儿童打开包装的产品ASTM-D3475测试，挤压瓶ASTM-D3475测试，包装袋ASTM-D3475测试，防止儿童打开包装ASTM-D3475测试

1970年，美国国会就通过了危险物品包装法案，授权美国消费产品安全委员会来规范产品包装的安全标准。本次测试以：美国消费产品安全委员会最新规范的产品包装安全标准《ASTM-D3475-15儿童安全包装的标准分类》进行测试，出具测试报告。

防止儿童打开包装ASTM-D3475测试

测试时间：3-4周

测试目的：防儿童打开包装

测试数量：400个

ASTM-D3475测试要求对象：

第一：要求200个小孩年龄分布

每组30%年龄在42-44个月之间的60人；

每组40%年龄在45-48个月之间的80人；

每组30%年龄在49-51个月之间的60人。

儿童年龄算法：小于15天的按不足一月算，15天及以上的按一个月算。

注：每个年龄段的男生与女生人数的比例不超过10%

第二：要求200个成年人年龄分布

每组30%年龄在50 – 54岁 之间的25人；

每组40%年龄在55 – 59 岁之间的25人；

每组30%年龄在60 – 70 之间的50人；

男女比例：30%：70%，其中女生年龄50-54岁之间的17-18人。

ASTM-D3475测试事项：

1.前五分钟由儿童自由打开，对打开和未打开的数量进行统计；

2.大人在儿童面前打开，然后在装好给到儿童，10分钟内看儿童自由打开和未打开的数量进行统计。

ASTM-D3475测试的意义

每一个家庭对儿童安全的保障是位居首位，在很多家庭环境中在儿童的安全上存在很多安全隐患。例如儿童无意间打开“包装的安全盖”误食药品，误食化学品，误食化妆品，误食有毒物品等等时有发生。为了保障儿童安全，包装使用防开启“安全盖”，从而减少和降低儿童打开误食的风险。

防开启“安全盖”的设计原理：“将包装食品，药品，化妆品，化学品等物质的盖子设置为内外两层，若仅施力旋转外层，是无法开启盖子。若打开盖子需要将外层盖施力往瓶身下压，同时带动内层盖旋转，才能成功开启盖子。由于这样的开启方式涉及两个方向的施力，增加了儿童开启盖子的难度，从而能够提高安全的作用”。

需要出具办理ASTM-D3475测试报告的化学品厂商，化妆品企业，药品企业，食品公司。

美国消费品安全委员会(CPSC)对包装袋，挤压瓶，儿童防打开安全盖，防止儿童打开包装的产品的测试要求CFR-2016-title16-vol2-sec1700-20

美国防儿童打开包装CPSC测试

制造商或一个产品的包装商金属容器或气溶胶形式制造商或包装商认为不需要遵守 § 1700.20

(a) SAUE要求应按照委员会的要求提供工作人员，书面解释为什么产品必须有金属容器或气溶胶。

(b) 制造商和希望这样做的包装商自愿向委员会提交合规办事处是一个理由，为什么他们的产品必须是在金属容器中或作为气溶胶。在这样的情况下，工作人员会回复制造商或包装商，如果要求，说明工作人员的意见理由的充分性。