

# 叶面肥 牡丹专用叶面肥 朴欣肥业

产品名称	叶面肥 牡丹专用叶面肥 朴欣肥业
公司名称	南阳市朴欣肥业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳宛城区天冠大道漯河物流园1号门
联系电话	15688186955

## 产品详情

### 叶面肥和农药可以混用吗？

叶面肥和可以混用吗？有关叶面肥与是否可以混用的问题，要根据的具体介绍。在进行药剂混用前应该仔细阅读说明书，做到心中有数。实际上，各种肥料和性质都会有所不同，如果混配不合理就会影响用肥、用药的效果，甚至产生肥害、药害。

### 叶面肥与混合时应注意的事项：

要确保混合后叶面肥和的形状稳定。这是因为叶面肥可能与发生化学或物理反应，影响的有效性或造成药害。若药液有不良表现，则不适宜混合使用。混合后即使药液物理性状良好，也要先进行小范围的试验，看看是否出现肥害、药害，然后再进行大面积使用。

叶面肥与的混用顺序要注意。一般是用足量的水先配好一种单剂的药液，再用这种药液稀释另一种单剂；而不能先混合两种单剂，再用水稀释，以免发生不良反应，造成有效成分的破坏和物理性状的恶化。

混合时要注意水量的使用。水对药液的影响很大，水的酸碱度、离子浓度等都会影响效果。配药用水以离子浓度低的中性水为好，如干净的雨水、河水等。

注意要现配现用。药液虽然在刚配时没有不良反应，但久置容易产生缓慢反应，茶叶叶面肥，使丧失或易产生药害。如有的品种虽然在弱碱性条件下较稳定，但也需注意现配现用，叶面肥哪家好，若长时间放置也易失效。

### 叶面肥与混合的使用禁忌

- 1、碱性不能与铵态氮肥和过磷酸钙等化肥混用，否则会使氨挥发损失，降低肥效。
- 2、含的不能与钾盐、钠盐类化肥混用，否则会产生可溶性而发生药害。

3、碱性肥料如氨水、石灰、草木灰等不能与杀虫剂等混用，否则会降低。

4、化学肥料不能与微生物混用。因为化学肥料具有挥发性和腐蚀性，与微生物如杀螟、青虫菌等混用，易微生物，降低。

## 花木叶面施肥必看

花木叶面施肥必看！

花木叶面施肥一般在开花前后期、壮果期、越冬前等时期进行。各期施肥按间隔7~10天1次，连续2~3次。营养生长期多施氮、钾肥，牡丹专用叶面肥，花芽形成期、壮果期要多施磷肥。不同的肥种在不同的时期喷施效果也不同，如磷肥、锌肥要在初花期喷施，而钼肥选择在花前喷施效果较好。

肥料的种类。要使观赏花卉的花大色艳，观果花木果丰叶茂，首先要满足它们对氮磷钾三种基本营养元素的要求，同时也不能缺乏其他微量元素???钙、镁、硫、铁、锌、硼、钼、铜、锰。叶面喷施浓度。花木施肥时还要注意不同的肥种配制不同的浓度，要注意避免浓度过大。浓度过大易造成花木药害现象，而药量不足，肥效不佳，又起不到很好的效果。

花木喷肥部位。施肥时，将喷施到叶子背面，叶面肥，以便被渗入气孔而易吸收。叶面施肥既要喷施花木树冠的外围，也要喷施树体的内膛枝叶，上下、里外叶片要全部喷到。另外，喷肥时要加还要注意喷药喷匀、喷细，雾化好，这样才能收到良好的效果。

叶面喷施时机。当气温在18 ~25 之间时，叶片气孔会全部张开，这时施肥将能大大地提高肥效；当气温超过30 时，叶片气孔关闭，喷施的肥料就难以被叶片吸收，这时不能喷药，以免造成药害；当空气湿度大时，肥液在叶片上停留时间长，被吸收的养分则较多；空气湿度小时，施肥不易被叶片吸收。因而，叶面施肥一般选择无风的晴天或阴天进行，很好以清晨或傍晚喷施效果很佳。喷肥时可加入光合营养膜肥使用助力植物吸收大量光肥、光能、光照、兼容常规肥料、养料供给植物生长发育。

叶面肥用作喷施的肥料纯度应该较高，浓度过高往往会灼伤叶片造成肥害。同一种叶面肥在不同的作物上喷施浓度也不尽相同杂质应该较少作物叶面追施又叫根外追肥。是快速补充营养，解除作物因缺乏营养元素出现的生理病害，促进作物健壮生长，由于叶面肥是直接配成溶液进行喷施的，所以叶面肥必须溶于水。用效果不明显应根据作物种类而定。叶面肥中的不溶物喷施到作物表面后，不仅不能被吸收有时甚至还会对叶片造成损伤。因此提高产量叶面肥有效办法叶面肥的浓度重要，浓度过高不仅造成肥害甚至伤叶面和组织。

作物叶面追肥十分普遍，是快速补充营养、促进作物健壮生长、提高产量的有效办法。但叶面肥的浓度十分重要，叶面肥中的不溶物喷施到作物表面后，不仅不能被吸收有时甚至还会对叶片造成损伤。因此提高产量叶面肥有效办法叶面肥的浓度重要，浓度过高不仅造成肥害甚至伤叶面和组织。

1、尿素：常用的喷施浓度为1-1.5%(即100公斤水加1-1.5公斤尿素)。双子叶植物，浓度可取下限；单子叶植物，浓度可取上限；幼苗期，浓度可适当低些；成苗期，浓度可适当高些。

2、磷酸二氢钾：常用的喷施浓度为0.1-0.3%。配制的方法是取100-300克磷酸二氢钾加100公斤水，充分溶解后喷施。

3、过磷酸钙：常用的喷施浓度为2-3%。肥料加水后要充分搅拌，静置24小时后经过滤，取清液喷施。

4、硫酸钾：常用的喷施浓度为1-1.5%。

5、硫酸锌：常用的喷施浓度为0.1-0.2%。在溶液中加入少量石灰液后进行喷施。

- 6、钼酸铵：常用的喷施浓度为0.05-0.1%。
- 7、硼砂（或硼酸）：常用的喷施浓度为0.2-0.3%。配制溶液时先用少量45℃热水溶化硼砂，再对足水。
- 8、草木灰：常用的喷施浓度为3-5%。用草木灰加水后搅拌，静置15小时后过滤再用。
- 9、稀土：对蔬菜、粮食作物常用的喷施浓度为0.05%，果树为0.08%。

叶面肥-牡丹专用叶面肥-朴欣肥业(诚信商家)由南阳市朴欣肥业有限公司提供。南阳市朴欣肥业有限公司（<https://www.puxin5658.com/>）位于南阳宛城区天冠大道溧河物流园1号门。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朴欣肥业在钾肥中享有良好的声誉。朴欣肥业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朴欣肥业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.puxin5658.com](http://www.puxin5658.com)）还是从事叶面肥，南阳水溶肥，叶面肥厂家的厂家，欢迎来电咨询。