

恐龙蛋李子苗基地，新疆恐龙蛋李子苗价格

产品名称	恐龙蛋李子苗基地，新疆恐龙蛋李子苗价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	2.00/棵
规格参数	粗度:0.8 高度:150 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

应该怎么对李子树进行定植？

时间。一般在秋季落叶后至春季发芽前均可定植。春旱地区秋季定植，无春旱则以2月中下旬定植为佳。

密度。株行距2×4m或3×3m或2×3.5m或2×3m亩栽76-111株。

定植穴（沟）。排水良好的土壤挖60cm深、80cm见方的定植穴，穴内先放100kg厩肥或垃圾，1kg石灰，再加复合肥、磷肥各0.5kg，油枝1kg，畜粪20kg与土拌匀后施入，再覆表土栽植。排水欠佳的土壤可挖80cm深、80cm宽的定植沟，以利排水。

授粉树配置。布朗系列品种间可互相授粉。现一果园需配置2-3个品种，且早、中、晚熟配套，主栽品种与授粉品种按10：1配置。

定植。苗木要求根系平展，细土掩埋，踏实，浇透定根水，嫁接口需露出土面

李子花果期的管理：李树易成花，坐果率高，但果个小。为了提高果品质量，除加强土肥管理和采取夏剪以控制营养生长外，要进行疏花疏果管理。在花芽膨大期（3月底）进行疏花，花束状果枝隔一个疏一个；在花后20至30天（5月上中旬），按一个花束状果枝留1至2个果，中小型果坐果间距4至8厘米，大型果坐果间距8至12厘米疏果。疏果时，疏去病虫果、伤果、畸形果。

一、施健树肥。采摘后一定要及时施肥，及时浇水灌溉，以恢复元气，健壮树势。肥料以速效氮肥为主，施肥量可根据结果多少，树势强弱而定。

二、病虫害防治

1、桃一点叶蝉。桃一点叶蝉危害叶片，严重时使叶片呈灰白色，造成树势衰弱，早期落叶，致使来年减产甚至绝收。8-9月份正是桃一点叶蝉虫口*密，为害*严重的时期。因此，采摘后要十分重视叶蝉的防治：先用护树将军全树喷涂杀菌防病，再用50%的马拉硫磷1000倍或40%的速扑杀乳油1000倍液杀虫，有效抑制虫卵的产生与繁殖。

2、穿孔病。穿孔病危害叶片、枝梢，大部分李园都有发生，要及时进行防治。农药用75%的百菌清700倍液，加入新高脂膜适量，可与治虫结合起来进行。

3、桑白蚧。有桑白蚧危害的李园，8月上旬要防治1-2次。9月中旬是桑白蚧第三代若虫发生盛期，一定要抓好防治。农药用40%的速扑杀乳油1000倍加95%的蚧螨灵机油乳剂150倍液，加入新高脂膜适量破坏病虫害抗药性，从而得到彻底的杀虫防病效果。

4、蛾蝶幼虫。对于蛾、蝶类的食叶幼虫，采摘后要及时检查，发现危害及时防治。

5、红蜘蛛。红蜘蛛在8 9月份还有危害，要进行防治，农药可用5%的尼索郎乳油1500倍加73%的克螨特乳油2000倍。危害严重的果园要在农药中加入新高脂膜适量提高杀虫效率。

。

三、修剪。采摘果实后要进行一次修剪，以疏剪为主。剪去竞争枝、密生枝、徒长枝，要采取控上促下，控外促内的原则。特别是对树冠外围和上部密生的枝条一定要进行疏剪。对于树冠过于郁闲，主枝、副主枝过多的李树，可先截去一部分大枝，再进行修剪。通过修剪，能减少养分的消耗，改善树冠的通风透光条件，提高光合作用能力，增加树体养分的积累，促进花芽的分化，提高花芽的质量。为明年春季的开花结果打上良好的基础。修剪后在修剪口涂抹护树将军乳液，消毒杀菌，保护伤口健康愈合。

四、深翻。在9月份一定要进行一次深翻，深度以20—30厘米为宜。这样能改良土壤，促使根系的新陈代谢和纵深发展，提高根系的吸收能力，提高李树抗干旱、抗瘠薄、抗病虫害能力。能有效地提高李树后期的光合作用能力，增强树势。

五、施足基肥。9月份在深翻的同时施足基肥，这是夺取全年稳产、高产的关键。深翻结合施基肥能有效地改良土壤，提高抗旱能力。基肥秋施，在落叶前，就能被根系吸收利用，有利于深翻后根系的恢复生长，能提高李树后期叶片的光合作用能力，增加树体养分积累，有利于来年的生长和结果