



，结合病虫害防治加喷优质有机叶面肥（国光氨基酸、氨基酸钙、绿芬威2号等）；加强疏花疏果和抹芽控梢；及时剪除病虫枝。

2、利用物理防治诱杀害虫：5月上旬开始挂诱虫灯，一般每20亩挂一灯，可有效杀灭蛾类、金龟子类、双翅目、同翅目类的多数害虫成虫，减少用药次数。

3、选用高效低毒无公害安全农药进行化学防治：

梨园：梨瘿蚊、梨木虱、梨圆蚧、蚜虫等在5月上中旬用5%啉虫脒3000倍加阿维菌素3000倍加70%戊唑醇5000倍（或20%三唑酮乳油1500倍加70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍加国光氨基酸1000倍防治，隔10天喷一次；喷后5天内梨果未套袋的，应在套袋前再喷一次。

葡萄：在葡萄开花前后主要做好穗轴褐枯病、白腐病、灰霉病、霜霉病、黑痘病等病害和透翅蛾、金龟子、叶蝉、螨类等虫害。新梢抽发后及时喷70%啉霉胺1500倍或50%异菌脲1000倍或25%菌思奇1500倍防灰霉病；并在药剂中加入10%苯醚甲环唑水分散剂2000倍或大生800倍或70%丙森锌可湿性粉剂600倍或70%猛杀生800倍防穗轴褐枯病、炭疽病等，加入70%戊唑醇5000倍或40%福星乳油6000倍防治黑痘病。若有叶甲、粉虱、蚧壳虫等虫害，用22%氯氰·毒死蜱乳油1000倍加5%啉虫脒乳油3000倍液。预防葡萄大小粒，喷21%富利硼酸1000倍加0.1%芸苔素内酯10000倍。

桃、李、梅等：主要有病虫害有褐腐病、疮痂病、灰霉病、桃蛀螟、蚜虫、桑白蚧、叶蝉、叶甲等，药剂选用5%啉虫脒乳油3000倍加阿维菌素3000倍加70%甲基托布津可湿性粉剂800倍加国光氨基酸1000倍，有灰霉病的桃树应加70%啉霉胺1500倍，每隔10天喷一次，连喷2-3次。