

【面向全国】供应优质的泰安绿化树苗竹子

产品名称	【面向全国】供应优质的泰安绿化树苗竹子
公司名称	泰安市镇雨苗圃
价格	7.00/棵
规格参数	产地/厂家:山东泰安 品种:毛竹 杆高:2(m)-5(m)
公司地址	中国 山东 泰安市泰山区 泰安市省庄镇安庄村
联系电话	86 0538 6570084 15163825151

产品详情

产地/厂家	山东泰安	品种	毛竹
杆高	2(m)-5(m)	地径	2(cm)-5(cm)
每丛枝数	10	竹鞭长	100(cm)

【面向全国】供应优质的泰安绿化树苗竹子

山东省泰安市镇雨苗圃【面向全国】供应优质的绿化树苗竹子，毛竹，青竹，黄金竹等。

竹的科属

门类:竹类 目科属：禾本科多年生木质化植

竹的科属

门类:竹类

目科属：禾本科多年生木质化植

竹子的寿命与繁殖：竹子是多年生一次开花植物，竹子开花是一种正常的自然现象，属于竹子结籽繁殖竹子高清图册(14张)的一个过程。我国古代人民早就观察到这种现象，在2000多年前的《山海经》中就有：“竹生花，其年便枯。”的记载。晋代戴凯所著的《竹谱》中记述着：“药必六十，复亦六年。”其注解是：“竹六十年亦易根，易根辄结实而枯死。”不过，竹子主要是进行无性繁殖的，每年春季从地下的竹鞭上长出笋来，然后发育成新竹。竹鞭不是它的根，而是地下茎。地下茎可以分为三个类型：单轴型的地下茎能继续生长，芽着生于两侧，侧芽发育成笋；合轴型的顶芽发育成笋，侧芽产生新的地下

茎，相连形成合轴，地下茎产生竹秆密集成丛，大熊猫喜欢吃的愉竹和华桔竹，就属于这一类；此外还有一种复轴型，是上述两种的混合型。竹子的有性生殖则像其他有花植物一样，先开花，后结籽，完成整个生长周期。竹子开花的周期，也因竹子种类不同有三种类型：少数竹子可以年年开花，开花后竹秆并不死亡，仍然可以抽鞭长笋；大部分竹子在整个生长过程中只开一次花，而且有一定周期，从40到80年不等，开花后秆叶枯黄，成片死去，地下茎也逐渐变黑，失去萌发力，结成的种籽即所谓竹米，下种后萌发生长，才能长成新竹，箭竹和华桔竹就属于这个类型；还有一种类型是不定期零星开花，开花后，竹林并不死去，例如慈竹就是其中的一种。华桔竹、大箭竹等都属于定期成片开花的一类。这类竹子开花的间隔时间很长，一般为50—60年；还有的甚至要近百年才开一次花。但是，不论哪一年长出的竹竿，只要竹鞭的年龄相同或相近，那么开花的时间就大体相同。即使生态环境差别很大，如阳坡、阴坡，陡坡、缓坡，不同的土壤，不同的海拔高度，都能同时开花

竹子的形态特征及种类：

竹是多年生木质化植物，具地上茎（竹秆）和地下茎（竹鞭）。竹秆常为圆筒形，极少为四角形，由节间和节连接而成，节间常中空，少数实心，节由箨环和秆环构成。每节上分枝。叶有两种，一为茎生叶，俗称箨叶；另一为营养叶，披针形，大小随品种而异。竹花由3部分组成。竹类的一生中，大部分时间为营养生长阶段，一旦开花结实后全部株丛即枯死而完成一个生活周期。

1.叶呈狭披针形，长7.5~16厘米，宽1~2厘米，先端渐尖，基部钝形，叶柄长约5毫米，边缘之一侧较平滑，另一侧具小锯齿而粗糙；平行脉，次脉6~8对，小横脉甚显著；叶面深绿色，无毛，背面色较淡，基部具微毛；质薄而较脆。竹类植物根据地下茎的生长情况可分为三种生态型，即单轴散生型、合轴丛生型、复轴混合型。竹类的种类繁多，我国有500余种，大多可供庭园观赏。常见栽培有：散生型的紫竹（*phyllostachysnigra*）、毛竹（*ph. pubescens*）、刚竹（*ph. uiridis*）、桂竹（*ph. bambusoides*）、方竹（*chimonobam - busaquadrangularis*）等，丛生型的佛肚竹（*bambusauentricosa*）、孝顺竹（*b. multiplex*）等，混生型的箬竹（*indocalamuslatifolius*）、茶秆竹（*pseu - dosasaamabilis*）等。

欢迎广大客户莅临选购