

# 禾苗种业 番薯红薯 红薯

产品名称	禾苗种业 番薯红薯 红薯
公司名称	广东禾苗种业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湛江市霞山区人民大道南50.52号国贸新天地A区商住楼A1座1706室
联系电话	18665785719

## 产品详情

### 移栽脱毒红薯苗的护理

待移栽苗活棵后，结合补苗追施1次沼液或充分腐熟的稀薄粪水，作为提苗肥。第2次在红薯结薯期，即春、秋种植后60d左右，冬种植后70d左右追施1次催薯肥。催薯肥以钾肥为主，一般每667平方米施自制有机肥（或有机认证有机肥）500kg、草木灰250kg或矿物钾镁肥25kg。施用方法一般是用犁破开垄两边，或用小锄在垄腰部开小沟，然后把肥料与益生菌拌匀进行条施，施后应进行1次浇水，以促其尽快发挥其肥效。同时施肥后可结合人工除草进行培土。

### 室内的红薯储藏技术的方式

由于红薯皮薄含水量大，易破损，易受冷害和病害，红薯，红薯不易贮藏。如果冬季贮藏不好，很容易腐烂变质。室内的红薯储藏技术有哪些方式?下面来学习一下吧!

薯块多时也可放在保温性好的室内贮存，存入初期，可加温连续4天4夜保持35—40度，可愈合机械损伤伤口，让薯体表面病菌。以后经常保持12度至14度可，并经常通风气。

另外如果薯量小，可贮藏在木箱内，放在室内温暖干燥处，保持不低于10度，不高于15度即可。

窖贮分长窖和井窖，薯量大时可用长窖，湛江红薯，薯量小时可用井窖。窖深一般需2.5m-3m，过浅易发生冻害，红薯苗，发生冻害的红薯心硬煮不熟。

贮藏红薯应在霜降前后5—10天气温在15度左右收获，气温降至10度以下时易受冷害易烂窖。红薯收获时要轻拿轻放，不要碰破表皮。下窖前要检出坏薯伤薯，用专用红薯保鲜剂喷洒薯体至湿透，然后用塑料布盖严闷6个小时左右，番薯红薯，掀开晾干表皮就可下窖了。

下窖前应对老窖进行清理，刮掉窖体表面陈土，用50%多菌灵1000倍液喷洒表面消毒。再在底部铺一层细砂再下窖。如果薯量过大，超过1米厚应每平方米应垂直放一用玉米杆扎成的草把一个，以利通风换气。

下窖后红薯表面出现水湿，叫做出汗，要以通风散湿为主。不要封闭窖门，待到室外气温接近10度时可以封窖。便窖温稳定在12到14度，相对湿度保持在80%左右。入窖后30-40天，至翌年温度回升之前成为越冬期。这时应以保温防寒为中心。由于薯块呼吸减弱，发热量小，外界气温又低。窖外要加厚土层，严封窖门，窖内要盖草保温。保持窖温在十二度到十四度之间，并要防止雨雪渗入和老鼠危害。

开春以后，窖内经过冬季封窖氧气缺乏，薯块生活力有所降低，如不通风换气容易感病，便会迅速蔓延。自此应以通风换气，稳定窖温为主。在保持窖温12-10度的前提下，揭开覆盖。首先打开窖门，加强通风，保持薯块正常呼吸。但此时的天气时冷时热不稳定，应根据气温随时开盖窖门。红薯储藏技术有以上方式。

## 1、营养生长旺盛，生理机能提高

脱毒甘薯在苗床表现薯块萌芽性好，出苗早，产苗量和百苗重增加。田间春夏栽培均表现出薯苗缓苗快、长势旺、封垅早、茎节粗短、叶片肥厚，主茎长、叶面积、茎分枝、茎叶鲜重、干重、净光合速率均显著高于普通甘薯。

## 2、产量构成性状明显改善，品质好、商品薯率高

脱毒甘薯苗较普通苗结薯早，膨大快，块根数量和鲜重增加，出干率和出粉率提高。薯块整齐而集中，薯皮光滑，颜色鲜艳。

禾苗种业(图)-番薯红薯-红薯由广东禾苗种业有限公司提供。广东禾苗种业有限公司(www.gdhmzy.com)是一家从事“红薯种苗培育,种植,菌类机械生产,化肥销售等。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“禾苗种业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使禾苗种业在农作物种苗中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.gdhmzy.com)还是从事湛江红薯种苗，脱毒红薯种苗，红薯苗基地的厂家，欢迎来电咨询。