

徐香猕猴桃苗品种多样徐香猕猴桃苗基地批发根系发达成活率高

产品名称	徐香猕猴桃苗品种多样徐香猕猴桃苗基地批发根系发达成活率高
公司名称	泰安市清森农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处张庄村（注册地址）
联系电话	18505380567

产品详情

欢迎光临泰安开发区清森农业科技有限公司

由于市场价格变动，以上价格为参考价格，具体价格欢迎您旺旺咨询或电话咨询：18505380567

??;??
??5????????????????????????????????????5????
?4~7??

树体生长势强，枝条粗壮充实，节间中长，萌芽率65.6%，成枝率59.5%。五年生树的徒长性结果枝(长度31厘米以上)占15%，长果枝(长度16~30厘米)占20%，中果枝(长度6~15厘米)占15%，短果枝(5厘米以下)占50%。以徒长性果枝着生的果实大，品质好，短果枝着生的果实小。平均每果枝结果3.9个，以结果枝第2~5节为主要结果部位。

丰产性较强，嫁接苗定植
年开花株率达68%，三年生平均每公顷产量4200公斤，四年生平均每公顷产量20250公斤。

????????????????????5.8????5.1????4.8????70~110????137????????????????
????????????????;????????????????????????????????????15.3%~19.8%????C??99.4~123.0
??/100????1.34%????12.1%????8.5%????6.3????15~20????15~25????????30??
????0~2????3?????

徐香在江苏北部、沿江地区、上海郊县和山东、河南等黄淮地区，引种栽植均表现良好，适应性强。在碱性土壤条件下，叶片黄化和叶缘焦枯较少。由于其萌芽率、成枝率和坐果率均高，表现出丰产、稳产。在深厚肥沃通气良好的砂壤上中生长最好。

??

温度是限制徐香猕猴桃分布和生长发育的主要因素，每个种都有适宜的温度范围，超过这个范围则生长不良或不能生存。猕猴桃大多数种要求温暖湿润的气候，即亚热带或温带湿润半湿润气候，主要分布在北纬18~34度的广大地区，年平均气温约在11.3~16.9℃，极端最高气温42.6℃，极端最低气温约在-20.3℃，10℃以上的有效积温为4500~5200℃·h，无霜期160~270天。猕猴桃种群间对温度的要求也不很一致，如中华猕猴桃在年平均温度4~20℃之间生长发育良好，而美味猕猴桃在13~18℃范围内分布最广。

猕猴桃的生长发育阶段也受温度影响，有研究表明美味猕猴桃当气温上升到10℃左右时，幼芽开始萌动，15℃以上时才能开花，20℃以上时才能结果，当气温下降至12℃左右时则进入落叶休眠期，整个发育过程约需210~240天，这期间日温不能低于10~12℃。

光照

多数猕猴桃种类喜半荫环境，对强光照射比较敏感，属中等喜光性果树树种，要求日照时间为1300~2600小时，喜漫射光，忌强光直射，自然光照强度以40%~45%为宜。猕猴桃对光照条件的要求随树龄变化而变化，幼苗期喜阴、晾需适当遮荫，尤其是新移植的幼苗更需遮荫。成年结果树需要良好的光照条件才能保证生长和结果的需要，光照不足则易造成枝条生长不充实，果实发育不良等，但过度的强光对生长也不利，常导致果实日灼等。