

一公分嫁接桃树苗多少钱一棵，一公分嫁接桃树苗批发价格

产品名称	一公分嫁接桃树苗多少钱一棵，一公分嫁接桃树苗批发价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	2.00/棵
规格参数	粗度:1 高度:150 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

桃根癌病对花生有什么危害？桃根癌病发生原因是什么？用什么农药可以防治桃根癌病？以下耕种帮种植网就作简单介绍，供网友们参考。

一、桃根癌病症状及危害

桃根癌病是在多种果树苗木上一种重要的根部病害，从病菌侵入到显现病瘤所需的时间由几周到一年以上。果园发病株率为30%~50%，严重的达100%。全国各地均有发生。

- 1、根部受害症状：根部被害后形成癌瘤，开始时很小，后不断增大，根瘤大而硬，木质化。瘤的形状不一致，通常为球形或扁球形，也可互相愈合合成不定形。大小不等，小的如豆粒，大的如胡桃。
- 2、茎部受害症状：瘤循茎干的长轴成串长出，长可达数寸乃至1尺以上。
- 3、植株受害症状：苗木上癌瘤绝大多数发生于接穗与砧木的愈合部分。初生时为乳白色或略带红色，光滑，柔软，后逐渐变呈褐色乃至深褐色，木质化而坚硬，表面粗糙或凹凸不平。

二、桃根癌病传播途径

桃根癌病为土壤习居菌，能在土壤中或癌瘤组织内越冬。病原细菌大多存在于癌瘤表层，瘤的形成以在土温22℃时为最适合，在18℃或26℃时，形成的瘤形状细小，在28~30℃时不易形成，30℃以上几乎不能形成。雨水和灌溉水为传病的主要媒介。病原通过伤口侵入寄主。苗木带菌是此病远距离传播的主要方式。

三、桃根癌病发病原因

一般桃树

芽接苗伤口大发病多。土壤湿度增高时，感病植株的数量随之增加。中性土壤和弱碱性土壤促进发病。黏土比砂壤土病重。耕锄不慎或地下害虫为害，会增加发病。

四、桃根癌病预防措施

- 1、选择无病土作苗圃。老果园，特别是曾经发生过根癌病的果园不能作为育苗基地。
- 2、桃苗采用芽接法嫁接，以避免伤口接触土壤，减少发病机会。嫁接工具使用前后须用75%酒精消毒，以免人为传播。
- 3、耕种帮种植网建议对桃树多施磷肥，增施磷、钾肥和酸性肥料，以提高树体的抗性，还可形成不利于病原发生的土壤环境。防治地下害虫。

五、桃根癌病防治农药

- 1、用生物制品-抗癌菌剂K845倍混合液蘸根系，防治效果可达90%以上。
- 2、桃的实生砧木种子用5%次氯酸钠处理5分钟后，再进行层积处理，同时层积处理要用新沙子。
- 3、用0.3%~4.4%硫酸铜液浸泡苗木根系1小时，或用1%硫酸铜浸根5分钟，然后冲洗干净。或用0.1%升汞浸根10分钟后再栽植。
- 4、用波美3~5度石硫合剂进行全株喷药消毒。
- 5、桃树在栽植前，可施硫磺粉50~100克/平米、50%福尔马林60克/平米或漂白粉100~150克/平米处理土壤，杀死土壤中的病原。
- 6、在田间发现病瘤应及时切除或刮除，并将刮切下的病皮带出果园烧毁，以防病原的扩散。刮后的伤口可用硫酸铜100倍液，或400~500mg/L农用硫酸链霉素，或波美5度石硫合剂，涂抹消毒。消毒后用1:2:100倍液倍式波尔多液保护或者用生物制品-抗癌菌剂K84的5倍混合液涂抹，然后用100倍硫酸铜溶液浇灌土壤。