



??

## 主要种类

秤星树（梅叶冬青）*Ilex asprella* (Hook. et Arn.) Champ. 落叶灌木，高3米。有长枝和短枝，小枝无毛，绿色，干后褐色，均具明显的白色皮孔，长枝纤细。产于仙居、龙泉、庆元、泰顺等地。生于海拔400~1000米的山谷、路旁灌丛中或阔叶林中。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、广西。根供药用，有消肿散瘀之效；叶含熊果酸，对冠心病、心绞痛有一定疗效。

榕叶冬青 *Ilex ficoidea* Hemsl. 常绿乔木，高12米。小枝黄褐色或红褐色，无毛。叶片革质，产于开化、仙居、临海、遂昌、松阳、龙泉、庆元、云和、景宁、缙云、丽水、瑞安、文成、泰顺平阳等地。生于海拔400~800米的山谷、溪边杂木林或灌丛中。分布于长江流域以南各省、区及台湾。日本也有。木材纹理直、结构细，材质中等，可供家具制作、细工、美术等用材。

广东冬青 *Ilex kwangtungensis* Merr. 常绿小乔木，高10米。树皮暗灰色。小枝有棱，干后黑色，被锈色或黄褐色短柔毛。产于龙泉、庆元、泰顺、文成、平阳等地。生于海拔250~900米的山坡、山谷、沟谷边的疏林中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

大叶冬青 *Ilex latifolia* Thunb. 常绿大乔木，高达20米。树皮灰黑色，全体无毛。小枝粗壮，黄褐色，有纵裂纹和棱。生于海拔250~800米的山坡、山谷的常绿阔叶林中，也常见栽培于房舍旁。分布于长江流域各省及福建、广东、广西。日本也有。叶和果作药用，也可作庭园的绿化树种。

矮冬青 *Ilex lohfauiensis* Merr. 落叶灌木或小乔木，高2~6米。树皮栗褐色，无皮孔。小枝纤细，密被短柔毛。产于金华、遂昌、松阳、龙泉、庆元、云和、景宁、丽水、泰顺、平阳等地。生于海拔200~900米的山坡灌丛中。分布于安徽、江西、福建、广东、广西。

铁冬青 *Ilex rotunda* Thunb. 常绿乔木，高20米。树皮淡灰色，小枝具棱角，红褐色，无毛。产于杭州、临安、普陀、仙居、龙泉等地。生于温湿肥沃的疏林中或山坡上。分布于长江流域以南至西南各省和台湾省，日本、朝鲜也有。树皮、根、叶供药用。

四川冬青 *Ilex zechwanensis* Leos. 灌木或小乔木，高1~10米；幼枝近四棱形，具纵棱及沟槽，被微柔毛或仅沟槽内被微柔毛，较老的小枝具突起的新月形叶痕，皮孔不明显；顶芽圆锥形，被短柔毛。